De nouvelles modalités diagnostiques ou thérapeutiques permettent d'affirmer qu'il s'agit d'un sujet en pleine évolution.

La fréquence des infections dans les prothèses totales du genou est supérieure à celle des autres arthroplasties (1 à 5 %).

Le mode de contamination est le plus souvent peropératoire, mais la complication hématogène paraît plus fréquente qu'autrefois. La différence entre infection précoce ou tardive, cliniquement valable, ne permet pas d'opposer le mode de contamination, le ou les germes en cause, et n'influe pas le pronostic.

Le diagnostic est dominé par l'association de signes cliniques et biologiques évocateurs. Le tableau habituel associe douleur et raideur articulaire. Les marqueurs de l'infection peuvent être normaux. La ponction, facile en cas d'épanchement, est le meilleur examen diagnostique. La mise en culture du liquide articulaire ou de fragments synoviaux voire osseux prélevés lors de l'intervention, permet de documenter l'infection. La numérisation des PN sur coupes histologiques congelées est prometteuse. La scintigraphie est utile dans les cas difficiles, l'hyperfixation aux trois temps est spécifique d'une infection.

La recherche de ou des germes en cause est essentielle. Les staphylocoques (Staphylocoques aureus et staphylocoques à gram négatif comme le staph. épidermis (SE)) sont le plus souvent en cause (70 %). Le streptocoque est souvent retrouvé, les grams négatifs sont plus rares. Il est important de préciser la réalité d'une méthirésistance. Le nombre d'infections à germes non identifiés est en diminution depuis la recherche systématique des mycobactéries et de la validation des processus de prélèvement.

Le traitement des infections est double, médical et chirurgical. Le traitement médical et d'autant plus efficace que l'infection est documentée. L'utilisation d'une triple antibiothérapie, par voie veineuse, favorisée par les chambres d'implantation sous cutanées, assure une meilleure tolérance et favorise l'observance du traitement.

Le traitement chirurgical oppose plusieurs méthodes qu'il convient d'adapter à la clinique. Si l'irrigation lavage n'a plus grand intérêt, le débridement articulaire peut être proposé de façon précoce dans les cas aigus, avant la mise en place du slime. La réimplantation en un temps nécessite des conditions favorables. Une meilleure documentation précoce permet d'y recourir plus volontiers. Il s'agit d'une méthode

d'avenir, moins coûteuse, elle donne les meilleurs résultats fonctionnels.

La réimplantation en deux temps a fait la preuve de son efficacité : entre 80 et 100 % de succès. Certaines de ses modalités : durée de l'intervalle libre, mobilisation avec le spacer sont actuellement en pleine évolution. L'arthrodèse apparaît réservée aux échecs de la réimplantation. L'amputation peut se discuter dans certains cas compliqués d'une atteinte grave de l'état général. Après réimplantation le traitement antibiotique doit être poursuivi entre 1 et 3 mois. La normalisation du premier temps scintigraphique est un bon guide de l'arrêt de traitement. Les critères de guérison sont cliniques, biologiques et radiologiques. En cas de récurrence ou de poursuite de l'infection, une réintervention s'impose, dans certains cas difficiles, multirécidivés, l'arthrodèse semble la solution la plus judicieuse.

Guérir une infection sur PTG est possible sous réserve que l'on dispose d'une équipe multi disciplinaire rodée, de la participation active du malade, mais aussi d'une méthodologie stricte et globale dans laquelle le geste chirurgical, s'il doit être irréprochable, n'est qu'un des éléments du succès thérapeutiques.

G. Gacon

Book review

Eur J Orthop Surg Traumatol (1998) 8: 6

European Journal of
Orthopaedic Surgery &
Traumatology

© Springer-Verlag 1998

Médecins/Laboratoires - 30 questions sur les avantages en nature

Maître Isabelle Lucas-Baloup (Avocat à la Cour de Paris) (1993) SCROF, Paris, 206 p., FF 250 (ISBN 2-909745-01-5)

Cet ouvrage paru en 1993 reste plus que jamais d'actualité. La grande majorité du corps médical a compris la nécessité d'une règle dans ce domaine. Cependant, lorsque l'on organise un congrès ou un séminaire avec l'aide logistique d'un laboratoire ou d'une industrie, on reste confondu devant certains confrères qui n'ont pas encore compris que la prise en charge ne les concerne qu'eux seuls ! La lecture de ce livre les éclairerait sûrement. Selon son habitude dans d'autres ouvrages, l'auteur propose au lecteur une série de questions sur le sujet, ici 30 et y répond en citant les articles de la

loi et en ajoutant, si besoin est, des commentaires. Un index, en fin d'ouvrage, permet, en plus de la table des matières, une entrée rapide au lecteur qui voudrait seulement vérifier un point précis.

A recommander à tous le corps médical et tout particulièrement aux médecins ou chirurgiens organisant ou participant à des EPU, des congrès etc.

P. Kehr

(contd. p. 11)