

New-Yorker Akademie der Medizin.

Abteilung für Dermatologie.

Ständige Sitzung vom 3. Oktober 1911.

(Präsident: Jerome Kingsbury.)

Fischer, Georg. Fall zur Diagnose. (Dem.)

21j. Mann, der ein Geschwür am Penis bemerkte, welches bei lokaler Behandlung heilte, während eine Adenitis inguinalis ulzerierte. Trotz mehrfacher antisyphilitischer Behandlung heilten von der Leiste zum Skrotum sich entwickelnde serpiginöse Geschwüre nicht. Wassermann stets negativ. Histologisch chronische Entzündung.

Diskussion. Klotz spricht den Fall für phagedänisches Ulkus an, bei welchem er durch Silberbehandlung gute Resultate hatte.

Pollitzer rät radikale Entfernung (Ätzung und Auskratzung).

Trimble und Pulsford vermuten Chancroide.

Kingsbury. Chancre der Wange. (Dem.)

Ein Fall.

Kingsbury. Lupus erythematosus. (Dem.)

Bemerkenswert durch den Beginn an Vorderarmen und Handrücken.

Kingsbury. Papulo-nekrotisches Tuberkulid. (Dem.)

19j. Mädchen. Erste Läsion an den Knien, nach Abheilung derselben nach mehreren Jahren rasch wachsende Nackendrüsen, welche operiert wurden. Seit 1 Jahr an Elbogen und Vorderarm, sowie Hand- und Fingerrücken neue Herde.

Diskussion. Pollitzer: Die papulo-nekrotischen Herde beginnen stets als subkutane Knoten, nicht als Follikulitis.

Dulmann. Chancre der Tonsille. (Dem.)

Ein Fall; die Diagnose wird in der Diskussion (Klotz, Pollitzer, Gilmour, Hubbard) bezweifelt; doch wird eine andere nicht gemacht.

Dulmann. Epitheliom der Tonsille.

42j. Mann; seit 8 Monaten wachsende Schwellung der linken Tonsille und rasch wachsende mächtige Drüsen-
schwellung der Nacken-, Achsel- und Brustregion. Gewichtsverlust.

Trotzdem erfolgt unter X-Strahlen Verkleinerung der Drüsen und Besserung (lokaler) Schlingbeschwerden.

(Referiert nach Journal of cutaneous diseases. 1912. Nr. 6.)

Rudolf Winternitz (Prag).