

Berlin 1912. — *Neumann*, Arch. f. Dermatol. u. Syphilis **61**, 163. 1902. — *Nicolas* und *Jambon*, Ann. de dermatol. et de syphiligr. 1909, Nr. 8/9. — *Nicolas, Gaté* und *Pillon*, Lyon méd. **130**, Nr. 13. 1921. — *Parounagian*, Arch. of dermatol. a. syphilol. **7**, Nr. 2. 1923. — *Pulvermacher*, Berlin. dermatol. Ges. 1919. 8. IV. — *Rille*, 87. Vers. dtsch. Naturforscher u. Ärzte 1922. 22. IX. — *Selenew*, Russische Zeitschr. f. Haut- u. verw. Krankh. **21**, 479. 1911. — *Scherber*, Wien. dermatol. Ges. 7. III. 1906. — *Schonnefeld*, Arch. f. Dermatol. u. Syphilis **98**, 101. 1909. — *Siemens*, Münch. dermatol. Ges. 25. VI. 1923. — *Sondermann*, Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. **70**, Nr. 1/2. 1923. — *Stollenberg*, Med. rev. 1923, Jg. 40, Nr. 1/2. — *Terebinsky*, Praktitscheski Wratsch 1909, Jg. 8, Nr. 38/40. — *Thibierge* und *Legrain*, Bull. de la soc. franç. de dermatol. et de syphil. 13. I. 1921. — *Thomson* und *Wakeley*, Journ. of obstetr. a. gynecol. of the Brit. Empire **28**, Nr. 2. 1921. — *Werther*, I. Tagung mitteldeutscher Dermatologen 5. XII. 1920. — *Zeisler*, Arch. of dermatol. a. syphilol. **6**, Nr. 2. 1922. —

Anmerkung bei der Korrektur. Die Mutter des beschriebenen Falles stellte uns vor wenigen Tagen ihr drittes, vor 3 Wochen geborenes Kind vor, welches völlig gesund und ohne die geringsten Zeichen von I. congenita ist. Sie hat während der ganzen Gravidität periodisch Thyreoidin gebraucht.
