

Tafel XXX.

Fig. 39—41. Vergr. 14:1. Weigertsche Färbung.

Fig. 39. Flache Lamina.

Fig. 40. Tiefe Lamina.

Tafel XXXI.

Fig. 41. Ungleich tiefe Lamina.

Fig. 42—44. Vergr. 19:1. van Giesonsche Färbung.

Fig. 42. Konische Lamina.

Tafel XXXII.

Fig. 43. Beginnendes Glaukom.

Fig. 44. Beginnendes Glaukom.

Tafel XXXIII.

Fig. 45. Vergr. 70:1. Hämatoxylin-Eosinfärbung. Altes Glaukom.

Fig. 46. Vergr. 19:1. van Giesonsche Färbung. Altes Glaukom.

Tafel XXXIV u. XXXV.

Fig. 47—50. Vergr. 19:1. van Giesonsche Färbung. Altes Glaukom.

Berichtigung.

In der Arbeit von R. Metzner und E. Wölfflin, Klinische und experimentelle Untersuchungen über Halssympathikuslähmung, II. Teil (dieses Arch., Bd. XCI, 2, 1916) sind auf S. 179, Zeile 13 nach „Versuchstieren“ die Worte: „mit vollständiger Ausschaltung des Sympathikus“ ausgefallen. Der vorletzte Satz des 2. Absatzes auf S. 179 heisst also vollständig: „Ein völliges Zurückgehen der okularen Symptome konnten wir bei den von uns beobachteten 18 Versuchstieren mit vollständiger Ausschaltung des Sympathikus in keinem Falle feststellen.“