

1737. M. E. Oustalet. Mission G. Révoil aux pays Comalis. Faune et Flore. — Note sur les Oiseaux recueillis dans le pays des Comalis par M. G. Révoil. — Vom Verfasser.
1738. Oustalet. Description de deux Oiseaux nouveaux de la coll. du Muséum d'Hist. nat. de Paris. [Extr. du Journ. „le Naturaliste.“ 1880.] — Von Demselben.
1739. Oustalet. Notes d'Ornithologie. 2^e. Série. [Extr. Bull. Soc. Philomat. Paris, Mars 1881.] — Von Demselben.
1740. Oustalet. Oiseaux nouveaux de l'Afrique orientale. [Extr. Bull. Soc. Philomatique de Paris, Août 1881.] — Von Demselben.
1741. Thom. Salvadori. Prodrum Ornithologiae Papuasiae et Moluccarum. XIII. *Natatores*. — XIV. *Struthiones*. [Estr. Att. Mus. Civ. di St. Nat. di Gen. Vol. XIII. 28. Agosto 1882.] — Vom Verfasser.
1742. D. G. Elliot. A Monograph of the *Bucerotidae*. Preface and Introduction. Published for the Subscribers by the Author. 1882. fol. — Vom Verfasser.
1743. Leonh. Stejneger. Outlines of a Monograph of the *Cygninae*. [From Proc. U. St. National Museum. May 1882.] — Vom Verfasser.
1744. R. B. Sharpe. A Note on *Strix Oustaleti* Hartl. [From Pr. Z. Soc. London, March 21 1882.] — Vom Verfasser.
1745. Sharpe. Contributions to the Ornithology of Neu-Guinea. Part. VIII. [Extr. from Lin. Society's Journ. Zoology vol. XVI. 1882.] — Von Demselben.
1746. Sharpe. On the correct generic and specific Name of the Indian Shámá. [From Ann. and Mag. Nat. Hist. July 1882.] — Von Demselben.
1747. A. G. Vorderman. Bataviasche Vogels. I. II. [Overgedrukt ut het Naturkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, Deel XLI, Aflevering 4. Batavia 1882.] — Vom Verfasser.
1748. Dr. C. Fr. W. Krukenberg. Die Farbstoffe der Federn. Vierte Mittheilung. [Sonderabdr. aus „Vergl.-physiol. Studien“. II. Reihe 3. Abth. 1882.] — Vom Verfasser.

Berichtigung.

Im Julihefte dieses Jahres ist auf S. 308 die Abbildung Fig. 10 durch ein Versehen in der Druckerei verkehrt gestellt, wodurch die Figuren-Erklärung nicht passt, und auch das im Text Gesagte keinen Sinn zu haben scheint. Die Figur sollte so gestellt sein, dass die Reihen kleinerer Mammillenquerschnitte, welches die von *Crax alector* sind, oben, und die eine Reihe grösserer — von *C. rubra* — unten stehen. — Dann fällt auch, wie im Text gesagt, der eine abnorme Querschnitt von *Crax alector* in die dritte Reihe und vor die Linie links vom Beschauer.