

Ornithologische Notizen aus Lesina,
 gesammelt von S. Buchich, mitgetheilt von
 Dr. A. Fritsch.

Von Zugvögeln, welche auf der Insel Lesina sich in grösserer Anzahl niederlassen, sind besonders die Wachtel und die Waldschnefpe zu nennen. Die Wachtel kommt von Mitte August bis Ende October, ist aber im September am häufigsten. Die Waldschnepfen kommen, sobald es anfängt kalt zu werden und ziehen dann den ganzen Winter. Sie kommen gleich den Wachteln meist mit Nord-Ost-Ost-Wind.

Als Brutvögel von Lesina können angeführt werden:

Der Häufigkeit nach:

<i>Passer domesticus.</i>	<i>Corvus corax.</i>
<i>Petrocincla cyanea.</i>	<i>Anthus sp.</i>
<i>Petrocincla saxatilis.</i>	<i>Hirundo rustica.</i>
<i>Lanius rufus.</i>	<i>Hirundo urbica.</i>

Sie verbleibt nicht auf der Insel, und nur höchst selten lassen sich einzelne Exemplare in den Föhrenwäldungen nieder, wo sie aber wegen Mangels an Nahrung sehr mager werden.

<i>Columba livia.</i>	<i>Bubo maximus.</i>
<i>Coturnix communis</i> , sehr selten.	<i>Athene meridionalis.</i>
<i>Perdix graeca.</i>	<i>Athene noctua.</i>
<i>Fringilla carduelis.</i>	<i>Sylvia hortensis.</i>
<i>Fringilla cannabina.</i>	<i>Sylvia atricapilla.</i>
<i>Emberiza melanocephala.</i>	<i>Muscicapa albicollis.</i>
<i>Astur palumbarius?</i>	<i>Colymbus (arcticus).</i>
<i>Tinnunculus alaudarius.</i>	<i>Charadrius (cantianus?).</i>

Ungewiss ist es, ob *Cotyle riparia* und *Cypselus apus*, welche die felsigen Stellen der Insel bewohnen, auch daselbst nisten.

Ueber Durchzug wurde 1874 verzeichnet:

26. Februar. Grosser Durchzug eines *Milvus (regalis?)* von Süden nach Norden.

22. März. *Ardea cinerea*, *Upupa epops*.

23. März. Eine *Hirundo rustica*, dann keine mehr.