2. Der beginnende Krebs des Uterus wird chirurgisch radikal geheilt werden können, wenn man für jede Art dieses Krebses durch Präparation festgestellt haben wird, wie weit dieselbe Metastasen in den Lymphdrüsen hervorrufen kann.

Azevedo Neves (Lissabon).

4) **Bericht aus der Lyoner Société nationale de médecine** (27. juin, 4. juillet). Presse médicale. No. 67. 20. août 1904. Ueber Krebsradiotherapie.

Herr Destot spricht über die von ihm in den zwei letzten Jahren mit Röntgenstrahlen in oft wiederholten Sitzungen behandelten und für unheilbar gehaltenen Krebsfälle.

Den besten Erfolg gaben die Gesichtscarcinome; in denjenigen der Brust, der Gebärmutter wurden die Schmerzen gemindert, jedoch der Prozess nicht gehemmt.

In diesen verzweifelten Fällen ist die Radiotherapie unbeständig und gefährlich, man hat aber die Pflicht, dieselbe verständig anzuwenden.

Herr Villard macht auf Fälle von mit derselben Therapie geheilten Hautkrebsen, aber folgender Lymphdrüsengeneralisation, aufmerksam.

Herr Lépine bespricht die Wirkung der X-Strahlen auf das Glykogen, welches in den bösartigen Geschwülsten vorhanden ist, und erklärt durch die mehr oder weniger lange Einwirkung der Strahlen die Verschlimmerung oder das Zurücktreten der Geschwülste. In der Tat zeigt die den X-Strahlen ausgesetzte Leberpulpa je nach der Dauer der Bestrahlung eine Erhöhung oder eine Verminderung in der Glykogenbildung und in der Glykolyse.

A. Herrenschmidt (Paris).