(Über die capillarmikroskopische Reaktion nach Bucky-Bestrahlung konnte ich mich auf dem Bonner Dermatologenkongreß 1927 kurz äußern. S. Arch. f. Dermat. 155, S. 101).

Es erscheint also möglich und wichtig zugleich, die Gefäßbefunde für die Analyse der Reaktionsfähigkeit als solche wie der Reaktionsart und -Intensität mitheranzuholen. Wir gelangen durch die Capillarmikroskopie zu wesentlich verfeinerten Kontrollen. Allerdings lassen sich solche Untersuchungen nur auf breiter Basis aufbauen, die zunächst am gesunden und kranken Gewebe die Arbeitslage der Gefäße und die Reaktionsfähigkeit einfachsten Reizen gegenüber studiert. Am Psoriasisherd¹ und auch an der Cutis marmorata^{2,3} ließ sich dartun, wie Verschiedenheiten der Reaktion des Gefäßendabschnittes der Haut von der jeweiligen Arbeitslage und speziell von der Stauung abhängen.

Bei der Verwertung der Befunde eines bestimmten Organs für ein anderes ist die größte Zurückhaltung am Platze. Gerade die Klinik der Hauttuberkulose zeigt uns auf Schritt und Tritt die Bedeutung der lokalen Bedingungen. Sie beginnen beim anatomischen Aufbau und gerade hier ist die wunderbare spezialisierte Anordnung des Gefäßendabschnittes in ihrer Eigenart besonders zu beachten.

Deshalb möchten wir von unseren Befunden aus weitere Ausblicke auf das Verhalten der Gefäße bei den Heilungsvorgängen am tuberkulösen Gewebe in anderen Organen unterlassen, so sehr gerade das Prinzipielle und Allgemeingültige zur weiteren Verfolgung herausfordert. Das Verhalten der Gefäße der perifokalen Zone zum tuberkulösen Herd spielt ja überall eine besondere Rolle. Nur verweisen möchte ich auf den von Wurm⁴ gebrachten Nachweis blutgefüllter Capillaren in der Epitheloidzellenzone tuberkulöser Prozesse der Lunge und die von ihm behandelten theoretischen Überlegungen über Bedeutung und Folgen capillärer Blutdurchströmung des tuberkulösen Granulationsgewebes.

¹ Dermat. Wschr. 88 (1929).

² Arch. f. Dermat. 157.

³ Arch. f. Dermat. 158.

⁴ Beitr. Klin. Tbk. 63.

Berichtigung.

Im Nachtrag zu unserer Arbeit: „Über den Einfluß der Luftdruckerniedrigung auf den Verlauf der Tuberkulose“ von W. Singer in Bd. 71 Heft 5/6 dieser Zeitschrift verweisen wir noch auf eine bereits in Bd. 69 Heft 6 erschienene Publikation von Dr. Sotero del Rio „Über den Einfluß der Luftverdünnung auf den Ablauf der experimentellen Meerschweinchentuberkulose“. Der genannte Autor hat an einer kleineren Zahl von Versuchstieren und unter Zugrundelegung anderer Gesichtspunkte zur Beurteilung des Ergebnisses, dieselbe Frage damit bereits vor uns experimentell untersucht. Unsere Versuchsergebnisse stimmen im Wesentlichen mit denjenigen von Dr. Sotero überein.

Dr. W. Singer.