der in den Frühstadien meist spaltförmigen Hohlräume lassen in Verbindung mit den jeweils im Bronchogramm nachgewiesenen Bronchialveränderungen darauf schließen, daß für die Kavernisierung des Tuberkuloms eine spezifische Bronchitis des versorgenden Astes Voraussetzung ist. Neuere Anschauungen über die Kavernenentstehung werden am Sonderfall des Lungentuberkuloms erläutert.

Die aufgezeigten Bronchialveränderungen können als spezifisches bronchographisches Diagnosticum bei der Abgrenzung des Tuberkuloms gegen das periphere Lungen- und Bronchialcarcinom und gutartige Lungengeschwülste angesehen werden und lassen auch Rückschlüsse auf Prognose und Dringlichkeit einer Operation des Tuberkuloms zu.

Literatur.

- ALBERT, A.: Beitr. Klin. Tbk. **78**, 647 (1931). — ASSMANN, H.: Beitr. Klin. Tbk. **60**, 527 (1925). — ATTINGER, E.: Oncologia (Basel) **3**, 140 (1950). — AUERBACH, O., and GREEN: Amer. Rev. Tbc. **42**, 707 (1940). — BERBLINGER: Ärztl. Forsch. **1949**, 497. Dort weitere Literatur. — BIRKELO, C. C., and CASPER: Radiology **28**, 157 (1937). — BRUNNER, A.: Dtsch. med. Wschr. **1950**, 501. — CATHIE: Dtsch. med. Wschr. **74**, 653 (1949). — CORYLLOS, P.: Amer. Rev. Tbc. **33**, 639 (1936). — CULVER, G. J., J. P. CONCANNON and I. F. McMANUS: J. Thorac. Surg. **20**, 798 (1950). — DAHL-IVERSEN, E., u. F. MÖLLER: Acta chir. scand. (Stockh.) **94**, 243 (1946). — DERRA, E.: Frühj.-Tagg Rhein-Westf. Tuberkulose-Ver.igg 29. März 1952, Düsseldorf. — DERRA, E., u. F. H. KOSS: Zbl. Chir. **76**, 1155 (1951). — DISSMANN, E.: Tuberkulosearzt **4**, 629 (1950). — HAIGHT, C., and J. M. FARRIS: J. Thorac. Surg. **9**, 108 (1939). — HAYECK, V. H.: Die menschliche Lunge. Berlin 1953. — HERTER, K.: Tuberkulosearzt **6**, 459 (1952). — IBERS, G., H. VIETEN u. K. H. WILLMANN: Fortschr. Röntgenstr. **74**, 667 (1951). — KAUFFMANN: Spezielle pathologische Anatomie. Berlin 1931. — KLEIN, W., u. K. WOLFF: Beitr. Klin. Tbk. **85**, 116 (1936). — KOCH, O.: Dtsch. med. Wschr. **75**, 1282 (1952). — KONJETZNY, G. E.: Chirurg **20**, 151 (1949). — LACHMANN, E.: Fortschr. Röntgenstr. **43**, 407 (1931). — MAURER-MAST, E., and R. M. FRANKLIN: Amer. Rev. Tbc. **43**, 301 (1941). — MOYES, E. N.: Thorax (Lond.) **6**, 238 (1951). — MUNTEAN, E., u. R. AMON: Fortschr. Röntgenstr. **73**, 156 (1950). — PAGEL u. HENKE: Handbuch der pathologischen Anatomie. Berlin 1930. — RADENBACH, K. L.: Beitr. Klin. Tbk. **106**, 539 (1952). — RÜTTIMANN, A. u. F. SUTER: Schweiz. med. Wschr. **26**, 591 (1953). — SCHINZ, H. R., W. E. BAENSCH, E. FRIEDL u. E. UEHLINGER: Lehrbuch der Röntgendiagnostik, S. 2288. 1951. — SELLORS, T. H., u. M. D. HICKEY: Thorax (Lond.) **4**, 82 (1949). — SPANJAARD, R. B.: Revue de la Tbc. **15**, 133, (1951). — STRAUB, H.: Z. klin. Med. **121**, 515 (1932). — UEHLINGER, E.: Beitr. Klin. Tbk. **92**, 170, (1939). — WENZL, M.: Wien. klin. Wschr. **63**, 735 (1951). — WILLMANN, K. H.: Fortschr. Röntgenstr. **78**, 281 (1953).

Dr. ERNST J. FISCHER, Essen-Bredeney, Brucker Holt 34.

Berichtigung

zur Arbeit NIEMSCH und SITR.

„Die Kombinierte antibiotische und Chemotherapie der Lungentuberkulose unter besonderer Berücksichtigung von Dihydrostreptomycin, Paratebin und Isoniaziden“, erschienen im Band 110, Seite 329—350.

Die letzte Spalte der Tabelle 2 auf Seite 333 muß wie folgt lauten:

Paratebin

—
1
10