

dung nicht durch mangelnde Reaktionsbereitschaft verursacht war, ging daraus hervor, daß jede leise *Berührung*, sei es der Fühler, der Flügel oder anderer Körperstellen, sofort die Fluchtreaktion auslöste. Ferner zeigte die geblendete Fliege auch am nächsten Tage noch genau das gleiche Verhalten. Ich betäubte die Fliege erneut und entfernte ihr die Rußdecke von den Augen. Sobald sie aus der Narkose erwacht war, flog sie wieder mit normaler Geschwindigkeit und Zielsicherheit herum; auf Fangbewegungen reagierte sie ebenfalls wie früher (auch hinter Glas). — Versuche mit anderen Exemplaren führten zum gleichen Ergebnis: auf Luftbewegungen wird nicht reagiert.

Somit hat sich die Vermutung GAFFRONS als nicht zutreffend erwiesen. Die Fluchtreaktion einer Fliege beim Versuch, sie mit der Hand zu fangen, wird nicht durch die Wahrnehmung von Luftbewegungen, sondern rein optisch ausgelöst.

SVEN DIJKGRAAF

Zoologisches Institut der Universität Groningen (Holland), den 4. Dezember 1946.

#### Summary

Contrary to GAFFRON, 1934, it has been shown that when flies flee from the catching hand, this reaction is merely due to optical stimuli (experiments with flies behind glass). Air movements play no part in this connection (experiments with blinded flies).

### La glycérine, la formaldéhyde, l'acétaldéhyde et la paraldéhyde, substances non vératriniques

On trouve dans VERZAR et FELTER<sup>1</sup> l'indication que la glycérine, la formaldéhyde, l'acétaldéhyde et la paraldéhyde engendrent sur les muscles gastrocnémien et sartorius de grenouille (*Rana esculenta*) une contraction du type vératrinique.

BACQ<sup>2</sup> a montré que le seul test sur lequel on puisse se baser pour dire d'une substance qu'elle appartient au groupe de la vératrine est qu'elle sensibilise à l'action des ions K.

Nous avons cherché si ces quatre substances peuvent être considérées comme substances vératriniques, c'est-à-dire si, comme la vératrine, elles sensibilisent à l'action des ions K.

La technique employée est celle de BACQ<sup>2</sup> qui utilise le muscle rectus abdominis de grenouille (*Rana temporaria* ou *Rana esculenta*) isolé dans un bain de Ringer oxygéné (le liquide de Ringer a la composition suivante: NaCl 6,5 g, KCl 0,1 g, CaCl<sub>2</sub> anhydre 0,25 g, NaHCO<sub>3</sub> 0,2 g pour 1 litre d'eau distillée); une solution de KCl est employée pour obtenir les contractions musculaires test à l'ion K. La glycérine a été utilisée en solutions N, N/2, N/10, N/100, N/1000, N/10000 et N/100000; la formaldéhyde en solutions N, N/10, N/100, N/1000, N/10000 et N/100000; l'acétaldéhyde en solutions N/10, N/100, N/1000, N/10000 et N/100000; la paraldéhyde en solutions N/10, N/100, N/1000, N/10000, N/100000 et N/1000000.

Pour chaque substance et chaque concentration expérimentées, la durée du bain a varié de 2 à 30 minutes.

<sup>1</sup> VERZAR et FELTER, Pflügers Archiv 158, 421 (1914).

<sup>2</sup> BACQ, Arch. int. Pharmacod. et Thérapie 63, 59 (1939).

Les résultats obtenus permettent de dire que:

1° ni la glycérine, ni la formaldéhyde, ni l'acétaldéhyde, ni la paraldéhyde aux concentrations utilisées ne sensibilisent à l'action des ions K alors que dans les mêmes conditions la vératrine utilisée en solution à 1/100000 ou 1/200000 manifeste ses propriétés sensibilisantes habituelles (BACQ<sup>1</sup>);

2° les quatre substances étudiées sont, dès qu'elles sont placées au contact du muscle, spontanément contracturantes pour certaines concentrations, généralement la glycérine pour une solution N, la formaldéhyde pour une solution N, dans certains cas déjà pour une solution N/100, l'acétaldéhyde et la paraldéhyde pour une solution N/10.

La glycérine, la formaldéhyde, l'acétaldéhyde et la paraldéhyde doivent donc être considérées comme des substances non vératriniques.

R. CHARLIER

Laboratoire de pathologie et thérapeutique générales de l'Université de Liège, le 3 décembre 1946.

#### Summary

Although they induce in the rectus abdominis muscle of *Rana* a veratrine-like contracture, glycerine, formaldehyde, paraldéhyde and acetaldehyde cannot be regarded as veratrinic substances because they do not sensitize for the contraction produced by the K-ion.

<sup>1</sup> BACQ, Arch. int. Pharmacod. et Thérapie 63, 59 (1939).

### Action inhibitrice du thiouracil sur la carotène

Dans le cours d'une série d'expériences par lesquelles nous avons démontré que l'iode exerce un effet protecteur sur l'action antithyroïdique du thiouracil lorsque cette substance est administrée à faibles doses (CANADELL et VALDECASAS<sup>1</sup>), nous avons observé que quelques animaux de laboratoire soumis pendant un long temps à des diètes purifiées dans lesquelles la vitamine A avait été substituée par le carotène, ont présenté des dérangements trophiques apparemment impossibles à expliquer uniquement par un déficit vitaminique puisque les animaux reçoivent des quantités suffisantes de la correspondante provitamine.

Nous avons étudié l'origine de ces altérations selon les expériences que nous résumons ci-après:

Un groupe de 10 rats blancs, d'un poids moyen de 43 g, furent mis à une diète composée d'amidon 67 g, gluten 16 g, caséine 2 g, levure de bière desséchée 10 g, et mélange salin de Steenbock 4 g. Chaque semaine les animaux reçoivent une dose suffisante de vitamines D et E et 60 microgrammes de  $\beta$ -carotène. Le développement de ce groupe d'animaux fut tout à fait normal.

Un autre groupe de rats analogue à l'anterieur fut soumis à la même diète, avec la seule différence que dans le mélange salin de Steenbock fut supprimé le iodure potassique et comme eau de boisson fut employée une solution de méthylthiouracil au 1/10000<sup>2</sup>. Au bout de trente jours ces animaux commencèrent à présenter

<sup>1</sup> CANADELL et VALDECASAS, Med. Clin. (Barcelona) 7, 44 (1946).

<sup>2</sup> Nous sommes redevables aux représentants en Espagne de J. R. Geigy S.A., Bâle (Suisse) du méthyl-thiouracil employé dans ces expériences.