Sulla caratterizzazione delle curve di diramazione dei piani tripli ⁽¹⁾.

Nota di OSCAR CHISINI e di CARLO FELICE MANARA (a Milano).

Sunto. - *Si studiano e si caratterizzano, dal punto di vista aritmetico e funzionale, le curve di diramazione dei piani tripli. Nel presente lavoro la suddetta caratterizzazione è limitata al caso dei piani tripli ottenuti per proiezione di una superficie di ordine n (≥ 3), sprovvista di curva multipla, da un suo punto multiplo secondo $n-3$.*

Si dimostra l'unicità birazionale del piano triplo avente una data curva di diramazione e si dà l'equazione effettiva di un suo modello proiettivo.

1. Introduzione. — È noto che lo studio delle curve di diramazione dei piani tripli può essere affrontato da un punto di vista strettamente algebrico, profittando delle formule che danno il discriminante dell'equazione cubica; ricerche in questo senso sono state fatte ⁽²⁾ tuttavia, pur essendosi ottenuti con questo mezzo notevoli risultati, non si può asserire che essi escano dal campo della pura descrizione e classificazione dei piani tripli. Nel presente lavoro ci proponiamo di studiare alcuni problemi che non pare siano stati ancora posti e formulati in maniera precisa ed esplicita. Pensiamo che tali problemi, pertinenti alla caratterizzazione delle curve di diramazione dei piani tripli, possano ridursi ai seguenti fondamentali:

A) Assegnare le condizioni caratteristiche (di tipo proiettivo e funzionale) sotto le quali una data curva φ è curva di diramazione di (almeno) un piano triplo;

B) Posto che una data curva φ soddisfi alle condizioni suddette, determinare i piani tripli, birazionalmente distinti, che la posseggano come curva di diramazione.

Con riferimento ad un particolare modello proiettivo di piano triplo, quale si ottiene proiettando su di un piano una superficie F di ordine n (con $n \geq 3$) da un suo punto O che sia $(n-3)$ -plo, noi ci limiteremo nel presente lavoro a trattare quello che chiameremo il « caso semplice » di piano triplo, cioè il caso in cui la superficie F non possieda curva multipla, nè propria nè infinitesima nell'intorno di O .

La trattazione di questo « caso semplice » ci permetterà di far vedere praticamente in qual modo intendiamo impostare e risolvere i problemi fon-

⁽¹⁾ Giunto alla Redazione nel gennaio 1946.

⁽²⁾ Cfr. p. es.: G. POMPILI, *Sulla rappresentazione algebrica dei piani tripli*, « Rend. Sem. Mat. Univ. di Roma », Serie 4^a, Vol. 3^o, 1939. Lo stesso A. ritornava sulla questione in: *Osservazioni sui piani tripli* « Rend. Ist. Lomb. », Vol. 74, 1940-41, studiando il comportamento dei piani tripli di fronte alle trasformazioni cremoniane.

damentali che abbiamo sopra enunciati (cfr. i risultati contenuti nei teoremi dei §§ 3 e 4 pag. 259 e 264) ed insieme di spianare la via alla trattazione di casi più generali.

Prima di iniziare la trattazione vera e propria vogliamo qui ricordare una nota proposizione, dovuta all'ENRIQUES ⁽³⁾, secondo la quale se una certa curva φ di ordine m , dotata di un certo numero di nodi e cuspidi, è di diramazione per un piano n -plo, lo stesso accade per ogni curva che si ottiene da φ mediante una variazione continua che ne mantenga, insieme con l'ordine, anche il numero dei nodi e delle cuspidi.

Le curve che in questa trattazione indicheremo con φ saranno sempre curve di diramazione di piani tripli e quindi potranno evidentemente possedere soltanto cuspidi.

Nel seguito sempre riterremo che le curve di cui ci occuperemo siano curve generiche del sistema continuo a cui appartengono; restano quindi fin da ora eliminati tutti i dubbi che potrebbero sorgere relativamente a speciali particolarizzazioni delle curve φ .

2. Curve covarianti, caratteri numerici e funzionali delle curve φ . — Consideriamo dunque una superficie F di ordine n (con $n \geq 3$) avente un punto $(n-3)$ -plo O e realizzante il « caso semplice » di piano triplo, cioè sprovvista di curva multipla, propria o infinitesima nell'intorno di O . Supposto, come è sempre possibile, che O sia il punto improprio dell'asse z , l'equazione di F assumerà la forma

$$(1) \quad F(x, y, z) = a_{n-3}z^3 + 3b_{n-2}z^2 + 3c_{n-1}z + d_n = 0$$

dove a_{n-3} , b_{n-2} , c_{n-1} , d_n sono polinomii in x, y di grado uguale al loro indice. Il nostro piano triplo potrà ritenersi disteso sul piano x, y e la sua curva di diramazione φ_m , di ordine m , sarà allora definita come il luogo dei punti dello stesso piano per cui le soluzioni della (1) non sono tutte funzionalmente distinte, oppure (che è lo stesso) come traccia sul piano x, y del cilindro, a generatrici parallele all'asse z , circoscritto alla superficie F ; l'equazione di φ_m si otterrà pertanto uguagliando a zero il discriminante della (1)

$$(2) \quad \varphi_m = a_{n-3}^2 d_n^2 + 4a_{n-3} c_{n-1}^3 - 6a_{n-3} b_{n-2} c_{n-1} d_n - 3b_{n-2}^2 c_{n-1}^2 + 4b_{n-2}^3 d_n = 0.$$

Enunceremo qui alcune proprietà della φ_m che, pur essendo o note ⁽⁴⁾ o di facile verifica, sono tuttavia da tener presenti perchè di grande importanza per la risoluzione dei nostri problemi fondamentali, risoluzione che affronteremo nei paragrafi seguenti. Interessano in primo luogo l'esistenza ed il

⁽³⁾ F. ENRIQUES, *Sulla costruzione delle funzioni algebriche di due variabili possedenti una data curva di diramazione*, « Annali di Matematica », Serie 4^a, I, 1924.

⁽⁴⁾ Cfr. per es.: i lavori di G. POMPILI citati alla nota ⁽²⁾.

comportamento di alcune notevoli curve covarianti proiettive di φ_m . Si hanno anzitutto le tre curve seguenti

$$(3) \quad \left\{ \begin{array}{l} \psi_{2n-3} = \begin{vmatrix} a_{n-3} & b_{n-2} \\ c_{n-1} & d_n \end{vmatrix} = 0 \\ \psi_{2n-2} = \begin{vmatrix} b_{n-2} & c_{n-1} \\ c_{n-1} & d_n \end{vmatrix} = 0 \\ \psi_{2n-4} = \begin{vmatrix} a_{n-3} & b_{n-2} \\ b_{n-2} & c_{n-1} \end{vmatrix} = 0 \end{array} \right.$$

che permettono di porre l'equazione della φ_m nella forma seguente

$$(4) \quad \varphi_m = \psi_{2n-3}^2 - 4\psi_{2n-2}\psi_{2n-4}.$$

Si hanno poi le due curve

$$(5) \quad \left\{ \begin{array}{l} \psi_{3n-6} = a_{n-3}\psi_{2n-3} - 2b_{n-2}\psi_{2n-4} \\ \psi_{3n-3} = d_n\psi_{2n-3} - 2c_{n-1}\psi_{2n-2} \end{array} \right.$$

ognuna delle quali permette una seconda espressione dell'equazione della φ_m come segue

$$(6) \quad \left\{ \begin{array}{l} a_{n-3}^2\varphi_m = 4\psi_{2n-4}^2 + \psi_{3n-6}^2 \\ d_n^2\varphi_m = 4\psi_{2n-2}^2 + \psi_{3n-3}^2 \end{array} \right.$$

In base a quanto siam venuti fin qui scrivendo sono di immediata dimostrazione le proprietà seguenti:

a) le cuspidi di φ_m sono date da quei punti di intersezione di ψ_{2n-3} con ψ_{2n-4} che non sono contemporaneamente intersezioni di a_{n-3} e b_{n-2} ; oppure da quei punti di intersezione di ψ_{2n-3} con ψ_{2n-2} che non sono contemporaneamente intersezioni di c_{n-1} con d_n . E di qui

b) tutte le nominate curve ψ sono aggiunte della φ_m .

c) La ψ_{2n-4} è tangente alla φ_m ovunque la incontra fuori delle cuspidi, in un gruppo T di $(n-2)(n-3)$ punti; la ψ_{2n-2} è pure tangente alla φ_m ovunque la incontra fuori delle cuspidi, in un gruppo T' di $n(n-1)$ punti.

d) La ψ_{2n-3} seca su φ_m fuori delle cuspidi il gruppo $T + T'$, che è composto di punti distinti quando a_{n-3} , b_{n-2} , c_{n-1} , d_n sono polinomii generici.

e) La ψ_{3n-6} è tangente in ognuna delle cuspidi di φ_m alla relativa tangente cuspidale ed incontra φ_m fuori delle cuspidi nei punti del gruppo T , avendo in ognuno di essi un nodo, con uno dei rami tangente a φ_m e quindi possedendo ivi tre intersezioni riunite con φ_m stessa. Analogo comportamento ha ψ_{3n-3} nelle cuspidi e nei punti del gruppo T' .

Un secondo gruppo di proprietà riguarda i caratteri aritmetici (o plückeriani che dir si voglia) della φ_m , caratteri che, tenuto presente quanto abbiamo detto alla fine del precedente paragrafo, si riducono a due fondamentali:

l'ordine m ed il numero delle cuspidi, numero che indicheremo con k ; essi son dati dalle formule

$$(7) \quad \begin{cases} m = 4n - 6 \\ k = 3(n - 1)(n - 2) \end{cases}$$

che sono di immediata dimostrazione.

Da quanto precede si deduce subito un terzo gruppo di proprietà della φ_m , proprietà queste ultime di tipo funzionale. Per formularle indichiamo con K il gruppo delle cuspidi di φ_m e con R un generico gruppo di suoi punti allineati. Si ha allora

$$(8) \quad \begin{cases} T' \equiv T + R \\ T + K \equiv (n - 2)R. \end{cases}$$

Si ha poi che la serie completa di tutti i gruppi equivalenti a $T + R$ ha dimensione non minore di 3 ossia

$$(8') \quad |T + R| = g_{n(n-1)}^{3+s}$$

con $s \geq 0$.

3. Caratterizzazione funzionale delle curve φ . — Passiamo ora a risolvere i nostri problemi fondamentali, cioè a caratterizzare completamente (almeno nel « caso semplice » di cui ci occupiamo qui) le curve di diramazione dei piani tripli e costruire questi ultimi a partire dalle curve stesse. Per quanto riguarda la caratterizzazione ricordiamo che essa dovrà necessariamente basarsi su altre proprietà delle curve oltre al possesso di dati caratteri plückeriani, poichè è noto che tale possesso è condizione necessaria ma non sufficiente perchè una data curva sia di diramazione per un piano multiplo ⁽⁵⁾; precisamente noi sfrutteremo le proprietà di tipo funzionale (8) ed (8') che abbiamo enunciate alla fine del precedente paragrafo.

Consideriamo dunque una curva irriducibile φ_m dotata di sole cuspidi e possedente i caratteri plückeriani soddisfacenti alle relazioni aritmetiche proprie del « caso semplice » cioè un ordine m tale che

$$(7') \quad n = (m + 6)/4$$

sia intero e un numero di cuspidi k dato da

$$(7'') \quad k = 3(n - 1)(n - 2).$$

Indichiamo ancora con K il gruppo delle cuspidi di φ_m e con R un generico gruppo di suoi punti allineati; sia poi C un generico gruppo canonico e ψ_i una generica aggiunta di ordine i .

⁽⁵⁾ Cfr. per es.: B. SEGRE, *Sulla caratterizzazione delle curve di diramazione dei piani multipli generali*, « Mem. Acc. d'Italia », Vol. I°, n. 4, 1930.

Sussiste il seguente

TEOREMA I. — La φ_m è curva di diramazione di un piano triplo se sono verificate le due seguenti ipotesi

1. — Il gruppo K è contenuto nella serie completa di tutti i gruppi equivalenti ai gruppi segati dalle curve di ordine $(n-2)$ ossia esiste un gruppo T di t punti tale che il gruppo $T+K$ è equivalente a tutti i gruppi segati dalle curve d'ordine $(n-2)$; in formule

$$(9) \quad T+K \equiv (n-2)R$$

2. — La serie completa di tutti i gruppi equivalenti a $T+R$ non ha punti fissi e quindi ha dimensione non minore di 3, ossia

$$(10) \quad |T+R| = g_{n(n-1)}^{3+s}$$

con $s \geq 0$.

Più precisamente si ha che il piano triplo per cui tale φ_m è di diramazione appartiene al « caso semplice ».

La dimostrazione sarà ottenuta costruendo un piano triplo per cui la curva data è di diramazione, cioè dimostrando che nelle ipotesi poste esistono quattro polinomi in x, y che indichiamo con $a_{n-3}, b_{n-2}, c_{n-1}, d_n$ tali che la φ_m può scriversi come discriminante della equazione di terzo grado in z

$$(1)' \quad a_{n-3}z^3 + 3b_{n-2}z^2 + 3c_{n-1}z + d_n = 0.$$

AVVERTENZA. — Prima di iniziare la dimostrazione avvertiamo che finora abbiamo usato indifferentemente una stessa lettera per indicare una curva algebrica ed un generico polinomio in x, y che, uguagliato a zero, ne fornisce la equazione ⁽⁶⁾; d'ora innanzi quando ci occorrerà indicare un ben determinato tra questi polinomi useremo la lettera stessa (con la quale indichiamo la curva ed un polinomio generico) munita di una sopralineatura.

Premesso ciò, passiamo alla dimostrazione del teorema, dimostrazione che, per maggior chiarezza, daremo nel caso particolare in cui è $n=7$, avvertendo però che la sua validità sussiste in generale, essendo il caso particolare trattato del tutto caratteristico.

Sia dunque una φ_m per cui $n=7$ e quindi $m=22, k=90$; calcoli immediati danno allora che il genere p di φ_{22} vale 120 e che il gruppo T di cui l'ipotesi n. 1 afferma l'esistenza consta di $t=20$ punti; la relazione (9) allora diventa

$$(9)' \quad T+K \equiv 5R$$

Osserviamo anzitutto che la serie $|5R|$ contiene la serie secata sulla φ_{22} dalle quintiche e quindi è una g_{110}^{20+s} con $s \geq 0$; essa risulta così speciale e verrà dunque secata dalla totalità delle curve aggiunte ψ_{19} (d'ordine $19=22-3$) passanti per un residuo gruppo fisso di 128 punti, gruppo che indicheremo con Γ .

(6) È noto che tale polinomio è determinato soltanto a meno di una costante moltiplicativa.

Possiamo dunque scrivere, indicando con C , come abbiamo già avvertito, un gruppo canonico,

$$|5R| \equiv |C - \Gamma|$$

Inoltre non può una ψ_{19} passare per i 110 punti comuni alla φ_{22} e ad una quintica generica senza spezzarsi nella quintica stessa ed in una residua aggiunta ψ_{14} ; possiamo dunque concludere che esiste una ψ_{14} passante per il gruppo Γ .

Consideriamo ora la serie completa $|C + 5R|$ secata dalla totalità delle curve aggiunte ψ_{24} ; ricordando le relazioni scritte qui sopra si ha:

$$C + 5R \equiv \Gamma + 10R \equiv \Gamma + 2K + 2T$$

esisterà dunque in base all'equivalenza qui scritta, una ψ_{24} secante il gruppo $\Gamma + 2K + 2T$; tale ψ_{24} dovrà avere quattro intersezioni riunite con φ_{22} in ogni cuspidale e quindi dovrà avere ivi un punto doppio, cioè sarà una biaggiunta a φ_{22} secante fuori delle cuspidi il gruppo $\Gamma + 2T$. Ma abbiamo già visto che il gruppo Γ è secato su φ_{22} da una ψ_{14} ; dunque, in base al classico teorema di NÖTHER, detto dell' $Af + B\varphi$, potremo scrivere

$$\bar{\psi}_{24} = \bar{\varphi}_{22}\bar{\varphi}_2 + \bar{\psi}_{14}\psi_{10}$$

e di qui deduciamo che il gruppo $2T$ sta su una ψ_{10} che è visibilmente una aggiunta. Come si verifica subito, tale ψ_{10} è unica e non ha intersezioni con φ_{22} fuori dei punti K e T .

Dal fatto che l'aggiunta ψ_{10} seca su φ_{22} (fuori dei punti doppi) il gruppo $2T$, segue che la totalità delle ψ_{15} secherà su φ_{22} la serie completa di tutti i gruppi equivalenti a $2T + 5R$; ma per la relazione (9')

$$2T + 5R \equiv 2T + K + T \equiv 3T + K.$$

Esisterà dunque una aggiunta ψ_{15} secante il gruppo $3T + K$; ossia tangente in ogni cuspidale di φ_{22} alla relativa tangente cuspidale ed avente tre intersezioni riunite in ognuno dei punti T . Facilmente si verifica che tale ψ_{15} è unica e non ha in comune con φ_{22} altro che i punti dei gruppi K e T . Consideriamo ora la curva generica del fascio

$$\psi_{15}^2 + \lambda\psi_{10}^3 = 0$$

essa ha l'ordine 30 e possiede essa pure una cuspidale in ognuno dei punti K (in cui ψ_{10} e ψ_{15} si intersecano semplicemente senza toccarsi) avendo ivi la stessa tangente cuspidale di φ_{22} . Essa ha quindi 6 intersezioni riunite con φ_{22} in ognuno dei punti K e, come si verifica facilmente, pure 6 in ognuno dei punti T ; in totale quindi $6 \cdot 90 + 6 \cdot 20 = 22 \cdot 30$ intersezioni nei punti K e T e quindi nessuna altra intersezione variabile fuori di essi. Potremo allora imporre che una curva del fascio possegga una ulteriore intersezione con φ_{22} ottenendo con ciò una curva spezzata nella φ_{22} stessa ed in una residua δ_8 ;

con una scelta opportuna dei polinomii sopralineati rappresentativi delle curve in questione potremo allora scrivere

$$(11) \quad \bar{\varphi}_8 \bar{\varphi}_{22} = 4\bar{\psi}_{10}^3 + \bar{\psi}_{15}^2.$$

Abbiamo fin qui utilizzato la relazione (9)' che traduce l'ipotesi n. 1 del nostro teorema; fissiamo ora l'attenzione sull'ipotesi n. 2. Da essa si deduce immediatamente che esiste (almeno) una ψ_{11} che contiene i punti T ciascuno una sola volta e quindi in particolare non è spezzata nella somma di una retta e della ψ_{10} . Infatti la totalità delle ψ_{11} passanti semplicemente per i punti del gruppo T secca la serie completa dei gruppi equivalenti a $T + R$, serie che, per ipotesi, non ha punti fissi.

Consideriamo ora la curva generica del fascio

$$\varphi_{22} + \lambda \psi_{11}^2 = 0$$

essa non ha intersezioni variabili con ψ_{10} , avendo con questa due intersezioni riunite in ognuno dei punti dei gruppi K e T . Potremo allora imporre che una curva del fascio si spezzi nella somma della ψ_{10} e di una ψ_{12} residua; scegliendo opportunamente i polinomii sopralineati rappresentativi delle curve potremo scrivere

$$(12) \quad \bar{\varphi}_{22} = \bar{\psi}_{11}^2 - 4\bar{\psi}_{10}\bar{\psi}_{12}$$

dove $\bar{\varphi}_{22}$ è lo stesso polinomio che compare nella (11) e $\bar{\psi}_{12}$ è visibilmente una aggiunta.

Osservando ora che la curva ψ_{15} passa per i punti comuni alla ψ_{10} ed alla ψ_{11} , potremo applicare ad essa il teorema di NÖTHER già invocato sopra e scrivere

$$(13) \quad \bar{\psi}_{15} = \bar{a}_4 \bar{\psi}_{11} - 2\bar{b}_5 \bar{\psi}_{10}$$

dove $\bar{\psi}_{15}$, $\bar{\psi}_{10}$ e $\bar{\psi}_{11}$ sono gli stessi polinomii che compaiono nelle formule precedenti ed $\bar{a}_4 = 0$, $\bar{b}_5 = 0$ rappresentano una quartica ed una quintica. Per quanto riguarda la prima poi è facile convincersi che essa passa per i punti T . Infatti nella relazione (13) sopra scritta il primo membro rappresenta una curva che ha tre intersezioni riunite con φ_{22} nei punti T ; nel secondo membro il termine $2\bar{b}_5 \bar{\psi}_{10}$ rappresenta una curva che ne ha almeno due; ne segue che la curva rappresentata dal termine $\bar{a}_4 \bar{\psi}_{11}$ ne deve avere almeno altrettante; ma $\bar{\psi}_{11}$ ha intersezioni semplici con φ_{22} nei punti T , dunque a_4 deve passare pure per essi.

Introduciamo ora nella (11) l'espressione di φ_{22} data dalla (12), tenendo conto della (13). Si ha

$$\bar{\varphi}_8 [\bar{\psi}_{11}^2 - 4\bar{\psi}_{10}\bar{\psi}_{12}] = 4\bar{\psi}_{10}^3 + \bar{a}_4^2 \bar{\psi}_{11}^2 - 4\bar{a}_4 \bar{b}_5 \bar{\psi}_{10} \bar{\psi}_{11} + 4\bar{b}_5^2 \bar{\psi}_{10}^2$$

ossia, raccogliendo i termini che contengono $\bar{\psi}_{11}^2$

$$(14) \quad \bar{\psi}_{11}^2 [\bar{\varphi}_8 - \bar{a}_4^2] = 4\bar{\psi}_{10} [\bar{\varphi}_8 \bar{\psi}_{12} + \bar{\psi}_{10}^2 - \bar{a}_4 \bar{b}_5 \bar{\psi}_{11} + \bar{b}_5^2 \bar{\psi}_{10}].$$

Ora il secondo membro di questa equazione è un polinomio divisibile per $\bar{\psi}_{10}$; tale deve dunque essere anche il primo membro. Ma abbiamo visto che ψ_{11} non si spezza nella somma di ψ_{10} e di una retta, mentre d'altra parte non può il polinomio di ottavo grado $\bar{\vartheta}_8 - \bar{a}_4^2$ essere divisibile per $\bar{\psi}_{10}$ senza essere identicamente nullo. Si ha quindi identicamente

$$(15) \quad \bar{\vartheta}_8 = \bar{a}_4^2.$$

La relazione (11) tenendo conto dell'identità ora dimostrata diviene

$$(11)' \quad \bar{a}_4^2 \bar{\varphi}_{22} = 4\bar{\psi}_{10}^3 + \bar{\psi}_{15}^2.$$

Di qui si deduce che la quartica a_4 deve essere tangente a φ_{22} nei punti T . Se infatti non lo fosse la curva complessiva $\bar{a}_4^2 \bar{\varphi}_{22}$ avrebbe ivi una singolarità composta di un punto triplo con due rami tangenti tra loro ed il terzo no; il che si verifica facilmente essere impossibile in un punto che sia comune a ψ_{10} ed a ψ_{15} in quanto la sua equazione si scrive anche $4\bar{\psi}_{10}^3 + \bar{\psi}_{15}^2 = 0$.

Ritorniamo ora sulla espressione (13); per quanto abbiamo ora osservato, al secondo membro il termine $\bar{a}_4 \bar{\psi}_{11}$ rappresenta una curva che ha tre intersezioni riunite con φ_{22} in ognuno dei punti T ; sappiamo che uguale proprietà ha la ψ_{15} . Dunque anche la curva $\bar{b}_5 \bar{\psi}_{10}$ deve avere tre intersezioni riunite con φ_{22} in ognuno dei punti T ; ma abbiamo visto che ψ_{10} ne ha due e non più, dunque anche la quintica b_5 dovrà passare per i punti T . Applichiamo allora il teorema di NÖTHER già invocato più di una volta alla curva ψ_{11} che passa per i punti T , i quali esauriscono le intersezioni di a_4 e b_5 . Avremo

$$(16) \quad \bar{\psi}_{11} = \bar{a}_4 \bar{\delta}_7 - \bar{b}_5 \bar{\gamma}_6$$

dove $\bar{\gamma}_6 = 0$ e $\bar{\delta}_7 = 0$ rappresentano curve di ordine 6 e 7 rispettivamente. Analogamente possiamo fare per la ψ_{10} la quale, essendo tangente a φ_{22} e quindi alla a_4 in tutti i punti T potrà scriversi

$$(17) \quad \bar{\psi}_{10} = \bar{a}_4 \bar{c}_6 - \bar{b}_5^2$$

dove $\bar{c}_6 = 0$ rappresenta una curva di ordine 6. Introduciamo ora queste espressioni nella (13); avremo, eseguiti i calcoli

$$\bar{\psi}_{15} = \bar{a}_4^2 \bar{\delta}_7 - \bar{a}_4 \bar{b}_5 \bar{\gamma}_6 - 2\bar{a}_4 \bar{b}_5 \bar{c}_6 + 2\bar{b}_5^3.$$

Se ora costruiamo l'espressione $4\bar{\psi}_{10}^3 + \bar{\psi}_{15}^2$ otteniamo

$$\begin{aligned} 4\bar{\psi}_{10}^3 + \bar{\psi}_{15}^2 &= 4(\bar{a}_4^3 \bar{c}_6^3 - 3\bar{a}_4^2 \bar{b}_5^2 \bar{c}_6^2 + 3\bar{a}_4 \bar{b}_5^4 \bar{c}_6 - \bar{b}_5^6) + \\ &+ \bar{a}_4^2 (\bar{a}_4 \bar{\delta}_7 - \bar{b}_5 \bar{\gamma}_6 - 4\bar{b}_5 \bar{c}_6)^2 + 4\bar{a}_4 \bar{b}_5^3 (\bar{a}_4 \bar{\delta}_7 - \bar{b}_5 \bar{\gamma}_6 - 2\bar{b}_5 \bar{c}_6) + 4\bar{b}_5^6 = \\ &= \bar{a}_4^2 [4\bar{a}_4 \bar{c}_6^3 - 12\bar{b}_5^2 \bar{c}_6^2 + (\bar{a}_4 \bar{\delta}_7 - \bar{b}_5 \bar{\gamma}_6 - 2\bar{b}_5 \bar{c}_6)^2 + 4\bar{b}_5^3 \bar{\delta}_7] - 4\bar{a}_4 \bar{b}_5^4 (\bar{\gamma}_6 - \bar{c}_6) \end{aligned}$$

e di qui, tenendo conto che, in base alla (11)' l'espressione sopra scritta deve essere divisibile per $\bar{a}_4^2$ otteniamo che o il polinomio $\bar{b}_5$ ha un fattore in comune con $\bar{a}_4$ o la differenza $\bar{\gamma}_6 - \bar{c}_6$ è divisibile per $\bar{a}_4$. Ma, come si verifica

subito dalle formule che danno $\bar{\psi}_{11}$, $\bar{\psi}_{10}$ e $\bar{\psi}_{15}$ la prima ipotesi è assurda giacchè porterebbe che $\bar{\psi}_{15}$ e φ_{22} avrebbero altri punti in comune oltre a quelli dei gruppi K e T , contro la circostanza prima rilevata; sarà dunque

$$(18) \quad \bar{\gamma}_6 = \bar{c}_6 + \bar{a}_4 \bar{\sigma}_2$$

dove $\bar{\sigma}_2$ rappresenta un polinomio di secondo grado.

Ritorniamo ora a considerare per un momento la formula (14); abbiamo dimostrato che è $\bar{\vartheta}_8 = \bar{a}_4^2$, dal che consegue che il primo membro di tal formula è identicamente nullo. Lo stesso deve quindi avvenire anche del secondo membro; ma non potendo essere identicamente nullo il polinomio $\bar{\psi}_{10}$ sarà tale l'espressione tra parentesi, la quale, tenendo conto che è $\bar{\vartheta}_8 = \bar{a}_4^2$, darà in definitiva

$$\bar{a}_4^2 \bar{\psi}_{12} + \bar{\psi}_{10}^2 - \bar{a}_4 \bar{b}_5 \bar{\psi}_{11} + \bar{b}_5^2 \bar{\psi}_{10} = 0.$$

Sostituendo in questa equazione le espressioni di $\bar{\psi}_{11}$ e $\bar{\psi}_{10}$ che son date dalle (16), (17) e tenendo conto della (18) otteniamo in definitiva

$$\bar{\psi}_{12} = \bar{b}_5 (\bar{\delta}_7 - \bar{b}_5 \bar{\sigma}_2) - \bar{c}_6^2$$

poniamo ora

$$\bar{\delta}_7 - \bar{b}_5 \bar{\sigma}_2 = \bar{d}_7$$

dove $\bar{d}_7$ risulta essere, come $\bar{\delta}_7$, un polinomio di grado 7; otteniamo così

$$\begin{cases} \bar{\psi}_{10} = \bar{a}_4 \bar{c}_6 - \bar{b}_5^2 \\ \bar{\psi}_{11} = \bar{a}_4 \bar{d}_7 - \bar{b}_5 \bar{c}_6 \\ \bar{\psi}_{12} = \bar{b}_5 \bar{d}_7 - \bar{c}_6^2. \end{cases}$$

Non resta ora che introdurre queste espressioni di $\bar{\psi}_{10}$, $\bar{\psi}_{11}$, $\bar{\psi}_{12}$ nella (12) per ottenere

$$\begin{aligned} \varphi_{22} &= (\bar{a}_4 \bar{d}_7 - \bar{b}_5 \bar{c}_6)^2 - 4(\bar{a}_4 \bar{c}_6 - \bar{b}_5^2)(\bar{b}_5 \bar{d}_7 - \bar{c}_6^2) = \\ &= \bar{a}_4^2 \bar{d}_7^2 + 4\bar{a}_4 \bar{c}_6^3 - 6\bar{a}_4 \bar{b}_5 \bar{c}_6 \bar{d}_7 - 3\bar{b}_5^2 \bar{c}_6^2 + 4\bar{b}_5^3 \bar{d}_7. \end{aligned}$$

È così provato che la nostra $\bar{\varphi}_{22}$ può scriversi come il discriminante della equazione cubica in z

$$(1') \quad \bar{a}_4 z^3 + 3\bar{b}_5 z^2 + 3\bar{c}_6 z + \bar{d}_7 = 0$$

cioè che essa è la curva di diramazione del piano triplo di equazione (1')

4. Identità birazionale di due piani tripli possedenti la stessa curva di diramazione. — Il teorema testè dimostrato risolve in modo esauriente il problema fondamentale *A*) in quanto siamo ora in grado di affermare che è certamente curva di diramazione di un piano triplo una φ_m che possegga le

proprietà caratteristiche enunciate al paragrafo precedente, cioè per cui sia

$$(7)' \quad (m+6)/4 = n \quad \text{con } n \text{ intero}$$

$$(7)'' \quad k = 3(n-1)(n-2) = 3(m^2-4)/16$$

$$(9) \quad T + K \equiv (n-2)R$$

la serie $T + R$ sprovvista di punti fissi

e più precisamente il piano triplo di cui si tratta rientra nel « caso semplice ».

Di più la tecnica dimostrativa seguita ci ha messi sulla via per una risposta esauriente anche del problema B), in quanto è stato costruito un piano triplo che ammette la curva data come curva di diramazione. Rimane ora a dirimere la questione se questo piano triplo sia unico (s'intende sempre nel campo birazionale) oppure ne esistano altri; ed in questo secondo caso occorrerà costruirli. Noi risolveremo qui anche il problema fondamentale B) dimostrando il

TEOREMA II. — *In relazione ad una curva φ_m soddisfacente alle condizioni sopra indicate esiste un unico piano triplo che la ammette come curva di diramazione.*

Per semplicità e per fissare le idee conserveremo i simboli del precedente paragrafo e ragioneremo sul caso particolare ivi trattato; per dimostrare il nostro assunto ci baseremo sui risultati delle recenti ricerche del CHISINI relative alla identità birazionale di due piani multipli aventi la stessa curva di diramazione ⁽⁷⁾. Ivi è dimostrato che due funzioni algebriche di due variabili $z(x, y)$ e $\zeta(x, y)$ possedenti la stessa curva di diramazione φ_m che sia dotata di soli nodi e cuspidi sono birazionalmente identiche sotto le due ipotesi seguenti:

1. — La curva φ_m appartenga a quello che ivi è chiamato il « caso generale » cioè possa pensarsi ottenuta per variazione continua da una forma limite φ'_m spezzata in parti $C_1, C_2 \dots C_n$ tutte doppie, in modo che le intersezioni di due C_i di indici consecutivi diano origine ciascuna a tre cuspidi di φ_m e quelle di due C_i di indici non consecutivi diano origine ciascuna a quattro nodi di φ_m .

2. — Le determinazioni di z e ζ siano in numero maggiore di quattro.

Ora che la nostra φ_{22} soddisfi all'ipotesi 1. si trova già dimostrata altrove ⁽⁸⁾. Sembrerebbe invece che una funzione algebrica $z(x, y)$ definita da un piano triplo fosse in stridente contrasto con l'ipotesi 2., senonchè anche questa difficoltà è presto superata. Infatti nel lavoro citato del CHISINI tale ipotesi è necessaria per la validità generale di un lemma fondamentale (ivi

⁽⁷⁾ O. CHISINI, *Sulla identità birazionale di due funzioni algebriche di due variabili dotate di una medesima curva di diramazione*, « Rend. Ist. Lomb. », Vol. 77, Fasc. 2°, 1943-44.

⁽⁸⁾ O. CHISINI, *Sulla curva di diramazione dei piani multipli*, « Rend. Lincei », Vol. 23. Serie 6^a, 1° sem. 1936.

lemma 2) relativo ai sistemi di sostituzioni, lemma che afferma: « Due sistemi S e Σ che siano ugualmente concatenati e di cui l'uno (S) sia transitivo su un numero $n \geq 4$ elementi, sono fra loro simili ».

Si presenta infatti, per $n \leq 4$ la eccezione fondamentale dei due sistemi: S dato dagli scambi (12), (23), (31) e Σ dato dagli scambi (12), (13), (14) che presentano la stessa concatenazione senza essere evidentemente simili. Ma si vede subito che, con l'ipotesi supplementare che i due sistemi in questione operino ambedue su tre elementi soltanto, il lemma sopra enunciato conserva in pieno la sua validità; e questo è appunto il caso in cui ci si trova quando si tratta di dimostrare la identità birazionale di due piani che siano ambedue tripli.

Sussistono dunque pienamente i risultati conseguiti dal CHISINI nel lavoro citato e rimane quindi dimostrata l'unicità del piano triplo costruito in relazione alla nostra φ_{22} .