consistently remove the rectum intact within the mesorectal fascia. Minor modifications to routine pathological dissection will enable pathologists to audit surgery and indicate when post operative radiotherapy is indicated. The efficacy of post operative radiotherapy in CRM positive patients is one arm of the new CR07 MRC study. Figure 1 shows the change in CRM positivity rates over time in Leeds from 36.3% to 18.3%.

Conclusions: There is marked variation in the quality of surgery for rectal cancer. This is shown not only by variation in CRM positivity rates between surgeons but also in local recurrence rates and mortality. Good TME rectal surgery leads to a marked reduction in all three. Data from *Arbman* et al. and *Heald's* data suggests that it is possible to improve 5 year survival from 48% to 68% if this is achieved in practice then surgery can yield a much bigger improvement than currently suggested from adjuvant therapy.

References

- (1) Adam JJ, Mohamdee MO, Martin IG, Scott N, Finan PJ, Johnston D, Dixon MF, Quirke P: Role of circumferential margin involvement in the local recurrence of rectal cancer. *Lancet* 1994;344:707-711.
- (2) Arbman G, Nilsson E, Hallböök O, Sjö Dahl R: Can total mesorectal excision reduce the local recurrence rate in rectal cancer surgery? *Br J Surg* (in press).
- (3) MacFarlane JK, Ryall RD, Heald RJ: Mesorectal excision for rectal cancer. *Lancet* 1993;341:457-460.

Qualitätsstandards für die pathologische Beurteilung von Rektumresektaten – die Österreichische Situation

F. Wrba (Institut für Klinische Pathologie, Universität Wien)

Die von der österreichischen Gesellschaft für Pathologie empfohlenen Richtlinien zur standardisierten Verarbeitung von

Rektumresektaten sollen einerseits zu einheitlichen, international vergleichbaren Diagnosen führen, und andererseits Informationen bereitstellen, die über die Prognose und das biologische Verhalten des individuellen Tumors Aufschluß geben (1, 2). Als wichtige Parameter, die in einem standardisierten Endbefund eines Rektumkarzinoms erfaßt werden sollen, werden vorgeschlagen:

Makroskopische Beschreibung:

- Identifikation des Resektats.
- Tumorbeschreibung: Lokalisation, Abstand zu den Resektionsrändern, Tumortyp, Größe, Invasionstiefe und Beziehung zum tiefen, lateralen Abtragungsrand (LRM), Serosabefund (Tuschemarkierung über Tumor).
- Nachweisbare Obstruktion, Stenose oder Perforation.
- Besonderheiten am Darm (CEDE, Poypen, Ulzera etc.).
- Erfassbare und identifizierbare Lymphknoten.

Histologie:

- Tumor: Typ, Grading nach Empfehlungen der ÖGP (3). Staging (AJCC/UICC), Dukes (Astler-Coller); Residualtumor (R) Klassifikation, Tumorgrenzen (expansiv/invasiv), Resektionsränder, Invasionstiefe, Einbrüche in Gefäße und perineurale Lymphspalten.
- Lymphknotenstatus: Anzahl der Lymphknoten/Anzahl infiltrierter Lymphknoten.
- Zustand des restlichen Darms (Adenome, DALMs bei CEDE usw.).

Zusätzliche Parameter (fakultativ):

- Genanalyse (p53, Kras, HNPCC, APC), Immunhistochemie (p53, MDM2, DCC, Ki67), Apoptosen, Durchflußzytometrie.

Literatur

- (1) Riddell RH, Haggitt R, O'Brien M, Pascal R, Snover D: *Modern Pathology* 1996;9:73-76.
- (2) Arbeitsgemeinschaft deutscher Tumorzentren: *Organspezifische Tumordokumentation*. Berlin-Heidelberg-New York, Springer, 1995.
- (3) Konsensusbericht der Österreichischen Gesellschaft für Pathologie: *Histologische Tumorklassifikation*. 2. Aufl. Wien-New York, Springer, 1994.

39. JAHRESTAGUNG DER ÖSTERREICHISCHEN GESELLSCHAFT FÜR CHIRURGIE MIT DEN ASSOZIIERTEN FACHGESELLSCHAFTEN

Termin und Ort: 11. bis 13. Juni 1998 – Baden.

Hauptthemen:

- I. Scheinbare Grenzgebiete der Chirurgie – Struma – Mamma – Varizen
- II. Rektoanale Tumoren – eine interdisziplinäre Aufgabe
- III. Ethik – Ökonomie – Qualitätssicherung. Können wir uns die Ethik in der Medizin noch leisten – oder begrenzt die Qualitätssicherung die Verschwendung?
- IV. Sinnvolle Entwicklungen im Bereiche der minimal invasiven Chirurgie.

Kongreßpräsident: Prim. Dr. Franz Stöger (Präsident der Gesellschaft 1997/98).

Kongreßsekretär: OA Dr. Gerald Humpel.

Kongreßsekretariat: A.ö. NÖ Landeskrankenanstalt Tulln, Chirurgische Abteilung, Alter Ziegelweg 50, A-3430 Tulln, Tel. +43/22 72/601 DW 551, Fax DW 7551.

Abstract Deadline: 16. Jänner 1998.