6. Ob die an Natriumverluste sich anschließende Exsikkationsazotämie mit oder ohne Hypochlorämie verläuft, hängt vom gegenseitigen Mengenverhältnis der in Verlust geratener Natrium- und Chlorione ab. Wird mehr Chlor entzogen als Natrium, so begleitet die Azotämie tatsächlich eine Hypochlorämie, wenn aber Natrium und Chlor im selben Mengenverhältnis zueinander entzogen werden, wie dieselben im Blutserum gelöst sind, so entsteht zwar die Azotämie nach demselben Entstehungsmechanismus wie die „hypochlorämische“ Form, aber Hypochlorämie tritt nicht auf.

7. Die Benennung „hypochlorämische“ oder „chloroprive“ Azotämie beruht auf Überwertung der pathogenetischen Rolle des Chlorstoffwechsels; diese Benennungen erscheinen uns um so unberechtigter als ein großer Teil der Salzverlusten folgenden Azotämien mit bloß geringer Serumchlorverminderung einhergehen. Richtiger erscheint die Benennung „extrarenale“ Azotämie, die bloß anzeigt, daß die Ursache der Azotämie nicht mit *organischem* Nierenleiden zusammenhängt.

Literatur.

- ¹ *Blum, L.*: Rôle du sel dans les néphrites. Paris 1931. — ² *Kerpel-Fronius*: Z. exper. Med. **85** (1932). — ³ *Ambard u. Stahl*: C. r. Soc. Biol. Paris **110** (1932). — ⁴ *Rudolf, M.*: L'Hypochlorémie. Paris 1932. — ⁵ *Strauß*: Klin. Wschr. **1931 II**, 2354. — ⁶ *Porges*: Klin. Wschr. **1932 I**, 186. — ⁷ *Sturm, A.*: Lehrbuch der speziellen Pathologie und Physiologie, 1935. — ⁸ *Glaß, J.*: Z. exper. Med. **82** (1932). — ⁹ *Morawitz u. Schloß*: Klin. Wschr. **1932 II**, 1628. — ¹⁰ *Kerpel-Fronius u. Butler*: J. exper. Med. **61** (1935). — ¹¹ *Ambard Stahl u. Kuhlmann*: Arch. Mal. Reins **8** (1934). — ¹² *Verspijck u. Maathuis*: Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1933**. — ¹³ *Gamble, L.*: New England J. Med. **1929**, 201. — ¹⁴ *Darrow u. Yannet*: Amer. J. Dis. Childr. **46** (1933). — ¹⁵ *Becher, E.*: Dtsch. Arch. klin. Med. **128** (1919); **135** (1921). — ¹⁶ *Slyke, van*: Quant. clinical Chemistry, Baltimore 1932. — ¹⁷ *Butler u. Tuthill*: J. of biol. Chem. **93** (1931). — ¹⁸ *Fiske*: Unveröffentl. Methode. — ¹⁹ *Utheim*: Amer. J. Dis. Childr. **20** (1920). — ²⁰ *Gamble, Roß u. Tisdall*: J. of biol. Chem. **57** (1923). — ²¹ *Goto*: J. of biol. Chem. **36** (1918). — ²² *Gamble, Blackfan u. Hamilton*: J. clin. Invest. **1** (1925). — ²³ *Kerpel-Fronius*: Z. Kinderheilk. **57** (1935). — ²⁴ *Gamble u. McIver*: J. of exper. Med. **48** (1928). — ²⁵ *Loeb, Atchley, Benedict u. Leland*: J. of exper. Med. **57** (1933). — ²⁶ *Kerpel-Fronius*: Z. exper. Med. **90** (1933). — ²⁷ *Schiff, E.*: Erg. inn. Med. **35** (1929). — ²⁸ *Csapó u. Kerpel-Fronius*: Mschr. Kinderheilk. **58** (1933). — ²⁹ *Klingner, R.*: Z. exper. Med. **92** (1933). — ³⁰ *Kramár, E.*: Jb. Kinderheilk. **114** (1926). — ³¹ *Surányi u. Sonnnauer*: Arch. Kinderheilk. **97** (1932). — ³² *Bottin*: Arch. internat. Méd. expér. **9** (1934). — ³³ *Swingle, Pfiffner, Vars u. Parkins*: Amer. J. Physiol. **108** (1934). — ³⁴ *Kiß, P. v.*: Arch. Kinderheilk. **193**. — ³⁵ *Slyke, van, Rhoads, Hiller u. Alving*: Amer. J. Physiol. **109** (1934). — ³⁶ *Mach, R., E. Mach u. Seicounoff*: Schweiz. med. Wschr. **1934 I**, 54. — ³⁷ *Gilman*: Amer. J. Physiol. **108** (1934). — ³⁸ *Mach, R.*: Rev. méd. Suisse rom. **54** (1934). — ³⁹ *Meyer, P.*: Klin. Wschr. **1933 II**, 1334.

Berichtigung.

In der Arbeit *Bruman und Blomberg*, Seite 229 dieses Bandes soll es in der 11. Zeile von unten heißen: 0,75 statt 0,15 cem 20%igem Acetonitril.