- (Dipt., Tachinidae) a parasite of the Fall Webworm. Preliminary Study Report in 1952. Zašt. bilja 16/17, 5—10, 1953. — Beitrag zur Kenntnis der parasitären Dipteren des Schwammspinners in Jugoslawien. Zašt. bilja 28, Dodatak, 1—10, 1953.
- Spaić, I.: Control of the Cockchafer larvae in nurseries. Zašt. bilja 10, 1—9, (SA), 1952. — Gipsy Moth control by means of aircraft. Supplementary tests. Zagreb 1952, 53 S. — Sur l'apparition de *Tortrix viridana* L. dans les forêts de Chênes de Croatie. Zašt. bilja 12, 70—73, 1952. — The effect of water on the egg caterpillars of the Gipsy Moth. Zašt. bilja 19, 18—16, 1953.
- Stančić, J.: Versuche zur Flugzeugbekämpfung des Maikäfers in Tutin 1952. Zašt. bilja 18, 80—85, 1953.
- Tomić, D.: Une étude de l'influence des températures élevées et l'immersion dans l'eau sur les chenilles en oeufs de *Liparis dispar*. Glasn. Sum. Fak. Beograd, 5, 221—212, 1952. — Les insectes nuisibles de la Montagne de Zlatar 1952. Glasnik Sum. Fak. Beograd, 291—302, 1954.
- Vajda, Z.: The influence of climatic vacillations upon the withering of the oak forests in the lowlands of the Posavina and the lower Podravina. Zagreb 1948, 134 S. — Bekämpfung des Ulmensterbens. Sum. list., 326—335, 1952. — Les causes du dépérissement épidémique des ormes. Glasnik Pol. Sum. Fak. Zagreb 10, 105—197, 1952.
- Vusić, K. et Sivojević, P.: Les insectes parasites de *Diprion pini* L. et leur action durant l'invasion de l'espèce en 1951—1952 dans la Montagne de Maljen (Serbie Occidentale). Zašt. bilja 27, 3—13, 1955.
- Virnik, F.: Die Fichtenblattwespe und unsere Erfahrungen in ihrer Bekämpfung. Godarski Vestnik 9, 209—220, 1951.
- Zečević, D.: Winter feeding and development of the Gipsy Moth under laboratory conditions in 1952—1953. Zašt. bilja 28, 3—20, 1955.
- Zivojinović, S.: Die Gradation der Borkenkäfer in den Nadelwäldern Serbiens 1915/17. Godn. Pol. Sum. Fak. Beograd, 65—73 (SA, n. J.). — Les Scolytes de la montagne Golija. Glasnik Sum. Fak. 1, 299—310, 1950. — Role of aircraft in Gipsy Moth control in 1947—1950. Zašt. bilja 6/7, 42—63, 1951. — Permanent Gipsy Moth supervision is the basis for its successful control in woods and orchards. Zašt. bilja 18, 1—4 (SA), 1953. — The Gipsy Moth clusters in East and South-East Serbia in 1953. Zašt. bilja 20, 9—102, 1953. — Trends of Entomological Researches in Yugoslavia. Zašt. bilja 20, 3—9, 1953. — History of the gradation and consequences of the defoliation it caused on the Maljen. Zašt. bilja 21, 1—19, 1954. — A Contribution to the knowledge of Scolytidae on the Maljen Mountain. Glasn. Sum. Fak. 8, 3—29, 1955.

Aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft,
Institut für biologische Schädlingsbekämpfung und Kartoffelkäfer-Forschung, Darmstadt

Die gegenwärtige Situation der biologischen Schädlingsbekämpfung in Deutschland

VON J. FRANZ

(Fortsetzung aus Anzeiger für Schädlingskunde 29. Jahrg. Heft 2, Seite 211)

III. Arbeiten des Institutes für biologische Schädlingsbekämpfung der BBA, Darmstadt

Wie oben bereits angedeutet, sollen an diesem mit 5 Wissenschaftlern besetzten Spezialinstitut vor allem solche Forschungsaufgaben bearbeitet werden, die gleichzeitig einen erhöhten technischen Aufwand und das Zusammenarbeiten mehrerer Spezialisten erfordern. Hierzu gehören vor allem:

1. Die Verwendung von Mikroorganismen zur biologischen Bekämpfung von Schadinsekten. 2. Die Einfuhr und Massenzucht von Entomophagen zur Bekämpfung eingeschleppter Pflanzenfeinde und Unkräuter. Da dem Institut ein Insektarium noch fehlt, konnte bisher nur das erste Thema bearbeitet werden. Daneben sind Grundlagenarbeiten über die Wirkungsweise natürlicher Feinde angelaufen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben ist das Institut in drei Sektionen gegliedert. Die Mitarbeiter der Sektion „Ökologie“ verfolgen im Freiland den Massenwechsel bestimmter Schadinsekten, unter besonderer Berücksichtigung der biotischen Begrenzungsfaktoren. Dabei wird unter Einschaltung ergänzender Laboratoriumsexperimente versucht, solche natürlichen Feinde, vor allem Krankheitserreger, zu finden, die sich zum Einsatz durch den Menschen eignen; ihre Bedeutung im Gradationsablauf wird dabei messend verfolgt. In der Sektion „Insektenpathologie“ werden die selbst gesammelten oder von anderen Stellen eingesandten kranken bzw. toten Insekten untersucht. Diagnose, Isolierung und Darstellung der Erreger¹⁾, Vermehrung und Infektionen kennzeichnen die weitere Bearbeitung. Liegen vielversprechende Krankheitserreger vor, so werden sie in Laboratoriums- und später in Freilandversuchen erprobt, in Zusammenarbeit mit der Sektion „Ökologie“ und verschiedenen anderen Instituten. Die Sektion „Histopathologie“ trägt schließlich durch histologische Untersuchungen gesunder und kranker Insekten dazu bei, den Vorgang und die Wirkung der Infektion im Wirtsorganismus verstehen und diagnostizieren zu können. Stetiger Gedanken-

austausch untereinander und Konzentration aller Mitarbeiter auf gewisse „Institutprojekte“ haben sich gut bewährt. Im folgenden wird über einige laufende und abgeschlossene Untersuchungen des seit März 1953 bestehenden und seit April 1954 personell voll besetzten Institutes stichwortartig berichtet.²⁾

1. Nadelholzblattwespen. Anfangs wurden die natürlichen Sterblichkeitsfaktoren der in Kiefernjugenden schädlichen Roten Kiefernbuschhornblattwespe (*Neodiprion sertifer* [Geoffr.]) studiert (19). Der Erreger einer dabei gefundenen Virose wurde dargestellt, die Grundlagen unter besonderer Berücksichtigung des Problems latenter Virosen untersucht (33). Die Seuche ließ sich bei äußerlich gesunden Tieren durch Behandlung des Futters mit Thioglycolsäure, Natriumfluorid oder anderen Stoffen, außerdem durch UV-Bestrahlung, provozieren (38). Im Freiland gelangen erstmalig Versuche zur künstlichen Infektion endemischer Blattwespen mit einer ebenfalls endemischen Virusseuche (23). Ferner gelang der Nachweis, daß die Polyederviren der genannten Art nach einer Passage durch den Darm einer Raubwanze (*Rhinocoris annulatus* L.) oder eines Rotkehlchens (*Erithacus rubecula* L.) infektiös bleiben. Damit gewinnen Prädatoren geringer direkter Wirkung eine erhöhte Bedeutung als Vektoren von Polyedersenden (24). — Die Krankheiten anderer Blattwespen werden in Zusammenarbeit mit der Niedersächs. Forstl. Versuchsanstalt, Abt. B, Göttingen, studiert.

2. Engerlinge von *Melolontha*. Durchzuchten von regelmäßig im Freiland gesammelten Engerlingen erlaubten es, den Gesundheitszustand der Population und die populationsdynamische Wirkung von verschiedenen Seuchen genauer als bisher möglich zu beurteilen (48). Parallel laufen Arbeiten über die Erreger der Engerlingsseuchen, unter denen eine Rickettsiose besonders wichtig ist (34, 47) und eine Microsporidiose neu beschrieben wird (35). Zum frühzeitigen Nachweis der Rickettsien wird neuerdings die Serodiagnose herangezogen (37).

¹⁾ Herrn Prof. Dr. U. Hofmann, Inst. f. unorgan. Chemie der T. H., Darmstadt, sei auch hier gedankt, daß er uns gestattet, das Elektronenmikroskop seines Institutes mit zu benutzen.

²⁾ Daß die genannten Arbeiten bald nach der Umstellung des Institutes begonnen werden konnten, verdanken wir im wesentlichen der Hilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Infektionsversuche mit einheimischen und eingeführten Erregergruppen schaffen die Grundlagen für die zu einem späteren Zeitpunkt geplanten Arbeiten im Freiland.

3. Tannentriebwickler (*Cacoecia murinana* Hb.). Untersuchungen über die Bedeutung biotischer Mortalitätsfaktoren aus dem Randgebiet einer Massenvermehrung im Schwarzwald (zusammen mit der Vogelschutzwärter Ludwigsburg, der die vogelkundlichen Arbeiten obliegen). Eine Kapsel-Virose (Granulose) hat im Zentrum der Kalamität andere Bedeutung als im Randgebiet, eine Polyeder-Virose wird erstmalig nachgewiesen. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sollen der forstlichen Praxis Bekämpfungsmethoden an die Hand geben, die entweder unter Verwendung oder bei weitgehender Schonung von Nutzorganismen die Gesamtbiozönose möglichst wenig verändern.

4. Tannenläuse. Bei der Tannenstammlaus (*Adelges piceae* [Ratg.]) ließ sich durch Anwendung neuartiger Kartierungsmethoden und Freilandexperimente erstmalig bei einem nur von Räubern (nicht von Parasiten) in Schach gehaltenen Insekt feststellen, wann und wie stark der Einfluß natürlicher Feinde im Vergleich zur Veränderung des Nahrungssubstrates wirkt (17, 22, 30). Diese Arbeiten sind die Grundlage für das Verständnis des Massenwechsels anderer, z. T. schädlicherer Tannenläuse; dadurch ergeben sich neue Ansatzpunkte für Bekämpfungsmaßnahmen.

5. Baumweißling (*Aporia crataegi*)⁶⁾ und Wiesenschnake (*Tipula paludosa*)⁷⁾ zeigen interessante Viruserkrankungen, bei denen zu klären ist, wie sie den natürlichen Gradationsablauf beeinflussen und ob sie für künstliche Infektionen und damit zur biologischen Bekämpfung im Freiland geeignet sind. — Weitere derartige, zusammen mit anderen Instituten geplante Arbeiten sind im Anlaufen.

6. Allgemeine Insektenpathologie. Über durchschlagende Erfolge bei der Bekämpfung mancher Schadorganismen durch künstliche Verbreitung spezifischer Krankheitserreger liegen aus dem Ausland neuere Beispiele vor (20). Vor allem solche Seuchen scheinen sich für eine praktische Verwendung zu eignen, die — einmal ausgebracht — den Bevölkerungsstand ihres Wirtes stetig senken können, z. T. durch die Hilfe spezifischer Überträger (21, 69). Dazu kommen Epizootien, die nur deshalb selten lange andauern, weil ihre Ausbreitungsfähigkeit zu gering ist; hier kann der Mensch gelegentlich durch künstliche Verbreitung nachhelfen. — Bei der Inangriffnahme eines neuen Forschungsgebietes ist es notwendig, allgemeine Methoden und Grundlagenfragen mit zu bearbeiten, damit später die auf praktische Anwendung zielende Arbeit darauf aufbauen kann. Einsendungen kranker Insekten erfordern laufende Diagnosearbeiten, um solche Viren, Bakterien, Mykosen und Protozoosen sicherzustellen, die sich für weitere Infektionsversuche eignen. Die Methoden zur Zucht von Insekten in sterilisierbaren Käfigen und zur färberischen Darstellung von Polyedern in histologischen Schnitten mußten verbessert werden (40, 41). Von weiteren insektenpathologischen Grundlagenarbeiten seien hier genannt: Intravital-Fluoreszenz-Mikroskopie zur Untersuchung zellpathologischer Reaktionen; Hämatologie und Immunologie gesunder und kranker Insekten im Laufe ihrer Entwicklung; Fehldiagnosen bei Untersuchungen kranken Materials (36).

IV. Internationale Zusammenarbeit

Die Verwendung von Lebewesen zur Schädlingsbekämpfung ist ihrer Natur nach international. Die Verbreitung von Nutzorganismen richtet sich bekanntlich

lediglich nach ökologischen, nicht nach politischen Grenzen. Daher gehört die Pflege des Kontaktes zu den ausländischen Fachinstituten gleicher Arbeitsrichtung mit zu den ersten Anliegen. Folgende Einzelheiten mögen auch einen weiteren Kreis interessieren:

1. In der Internationalen Kommission für biologische Schädlingsbekämpfung (CILB), deren offizielle Anerkennung durch die Bundesrepublik wünschenswert ist, werden solche Fragen bearbeitet, die mehrere Staaten gemeinsam angehen. Hierzu gehört z. B. die Entscheidung über Import von Entomophagen oder Erregern von Insektenseuchen, die europäischen, haustierartig gehaltenen Nutzinsekten (Seidenspinner) unter Umständen gefährlich werden könnten. Die Kommission, die organisatorisch der Union Internationale des Sciences Biologiques (UISB) angegliedert ist, koordiniert ferner die gemeinsam interessierenden Vorhaben; hierdurch werden Projekte, die einem Staat allein zu kostspielig würden, entscheidend verbilligt. Derartige Pläne werden auch z. T. von der Food and Agriculture Organization (FAO) und der Europäischen Pflanzenschutzorganisation (EPPÖ) mit unterstützt (Beispiel: Einfuhr von Parasiten zur biologischen Bekämpfung des Weißen Bärenspinners, *Hyphantria cunea* Drury, aus seiner nordamerikanischen Heimat nach Jugoslawien [15]). Zu den für uns wichtigsten Aufgaben der CILB gehört schließlich die Errichtung eines internationalen Bestimmungsdienstes für Nutzinsekten, an deren Finanzierung sich die Mitgliedstaaten gemeinsam beteiligen wollen. Hierdurch hofft man dem für alle Arbeiten unseres Gebietes gefährlichen Mangel an Spezialisten für Entomophagen etwas abhelfen zu können.

2. Durch die Aufnahme von Gastwissenschaftlern aus dem Ausland wird der persönliche Erfahrungsaustausch eingeleitet. Ein kanadischer Kollege von der Division of Entomology, Canadian Department of Agriculture, konnte z. B. vom Darmstädter Institut als „Hauptquartier“ aus in verschiedenen Gebieten Deutschlands Parasiten des Frostspanners (*Cheimatobia brumata* L.) sammeln, die zur biologischen Bekämpfung des neuerdings nach Kanada verschleppten Schädlings dorthin verschickt worden sind. Die Besuche führender ausländischer Wissenschaftler gaben wertvolle Anregung für die weitere Forschung. Dem Verfasser wird es durch ein Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft möglich sein, im Sommer 1956 den Einladungen des Science Service des Kanadischen Landwirtschaftsministeriums und verschiedener Institute der University of California Folge zu leisten.

3. Die Gründung der Internationalen Union für angewandte Ornithologie im August 1955 in Frankfurt a. M. wird ebenfalls dazu beitragen, die Zusammenarbeit mit den Fachkollegen im Ausland zu fördern. Dadurch, daß ein Deutscher (Dr. BRUNS, Würzburg) zum Sekretär dieser Vereinigung gewählt worden ist, ergibt sich für uns die Möglichkeit und Verpflichtung, den verstärkten internationalen Kontakt für die praktische Arbeit zu nutzen.

4. Durch die frühere Tätigkeit des Verfassers beim Commonwealth Institute of Biological Control besteht schließlich noch eine gute Zusammenarbeit und ständiger Erfahrungsaustausch mit dem Europäischen Laboratorium dieser Organisation und seinen Mitarbeitern (Direktor: Prof. L. P. MESNIL).

Ausblick

Dieser Zwischenbericht über den Stand eines Zweiges der Pflanzenschutzforschung, der bei uns noch recht jung ist, verfolgt einen doppelten Zweck. Einmal soll er all denen, die organisatorisch oder wissenschaftlich an diesen Fragen mitarbeiten, einen Überblick über das geben, was

⁶⁾ Bearbeitet zusammen mit Herrn Prof. BLUMCK.

⁷⁾ Bearbeitet zusammen mit dem Institut f. Grünlandfragen der BBA.

bei uns zur Zeit auf dem Gebiet der biologischen Schädlingsbekämpfung geschieht. Um dies zu erreichen, mußte von der sonst wohl begründeten Sitte abgewichen werden, nur über Arbeitsergebnisse, nicht über Vorhaben zu berichten. Wer die angeführten Publikationen zur Hand nimmt, wird jedoch feststellen, daß sie eine Fülle neuer und für die weitere Entwicklung der Pflanzenschutzpraxis wichtiger Resultate bereits enthalten. Der Weg zur Praxis-reife biologische Verfahren ist allerdings, wie schon öfters betont (16), länger als bei anderen Verfahren. Zwar zog sich die Entwicklung der Phosphorsäureester, um ein Beispiel zu nennen, über Jahrzehnte hin (62). Dann fand man jedoch Mittel, die gleichzeitig gegen Dugende von Insektenarten wirken. Ganz anders bei biologischen Verfahren: Sie sind zumeist Spezifika gegen solche Glieder der Lebensgemeinschaft, die — oft als Folge menschlicher Eingriffe — bedrohlich überhand nehmen. Um den je nach Schädling und Umweltverhältnissen verschiedenen, jeweils günstigsten Ansatzpunkt zu finden, benötigt die Forschung Zeit. Hier muß jeder Fall für sich bearbeitet werden. Diesem Nachteil steht gegenüber, daß die meisten biologischen Verfahren dauernd wirksam bleiben und daß der Schädling selbst i. d. R. keine Abwehrreaktionen entwickelt. Aber Zeitverlust bedeutet heute anscheinend sehr viel.

Damit kommen wir zum zweiten Grund dieses Zwischenberichtes: Er soll ein sachlich fundiertes Gegen-gewicht bilden gegen all jene Meldungen, die — über-trieben lobend oder verdamnend — dem Wesen biologi-scher Verfahren völlig fremd gegenüberstehen. Jede Schwarz-Weiß-Darstellung, jede Alternativ-Forderung („Vögel statt Gift“ usw.) ist ein Rückschlag, der zu weit-gehenden Mißverständnissen führen kann (71). Unser Be-mühen ist es, dann, wenn andere Bekämpfungsmethoden versagen oder beachtliche Nachteile haben, behutsam hier und dort bisherige Methoden abzuwandeln oder rein bio-logische Verfahren herbeizustellen, ohne dadurch die nach-haltig gute Qualität der Kulturpflanzen und ihrer Erträge im weiteren Sinne zu gefährden. Diese Aufgabe ist schwer genug, zumal in einem so intensiv bewirtschafteten Land wie dem unseren; verlangt sie doch, daß wir aufhören, den schnellen Erfolg zu überschätzen, und beginnen, nicht das Tempo der Rotationsmaschinen, sondern den Rhyth-mus des Lebendigen als das entscheidende Zeitmaß an-zuerkennen. Diese Umstellung wird nur gelingen, wenn weiterhin Staat, Wirtschaft und Praxis diesen Aufgaben aufgeschlossen gegenüberstehen, eingedenk ihrer Verant-wortung gegenüber den kommenden Generationen. Sollte es doch das Fernziel jedes Pflanzenschutzes, also auch der biologischen Bekämpfung, sein, das unter unseren Wirt-schaftsbedingungen erreichbare Höchstmaß an nachhalti-ger Regulationsfähigkeit auch in den Kulturlandschaften zu verwirklichen (42, 58). Auch das ist eine „Rationalisie-rung“ des Pflanzenschutzes, bei der die Zukunft ein-kalkuliert ist.

Literaturverzeichnis

(Aus dem sehr umfangreichen Schrifttum sind hier vor allem die neuesten und solche Arbeiten angeführt, die reichliche Literatur-hinweise bringen.)

- (1) Rabers, F. H.: "Chemical control and resistance to insecti-cides by agricultural pests" in "Journ. econ. Ent.", 46, 869—873, 1953.
- (2) Berker, J.: „Der Einfluß zweier Raubmilben auf die Popu-lation von *Metatetranychus ulmi*“, Vortrag 31. Dtsch. Pflanzensch.-Tagung, Kassel (1955) [im Druck].
- (3) Blunck, H.: „Zur Kenntnis des Massenwechsels von *Pieris brassicae* L. mit besonderer Berücksichtigung des Dürre-jahres 1947“ in „Zeitschr. angew. Ent.“, 32, 141—171, 1950.
- (4) Blunck, H.: „Parasiten und Hyperparasiten von *Pieris rapae* L.“ in „Zeitschr. Pflanzenkrankh.“, 58, 25—54, 1951.
- (5) Blunck, H.: „Mikrosporidien bei *Pieris brassicae* L., ihren Parasiten und Hyperparasiten“ in „Zeitschr. angew. Ent.“, 36, 316—333, 1954.
- (6) Blunck, H.: „Beobachtungen über Wanderflüge von *Pieris brassicae* L.“ in „Beitr. Entom.“, 4, 485—520, 1951.
- (7) Blunck, H. u. Martini, Chr.: „Das Massenaufreten des Baumweißlings (*Aporia crataegi* L.)“ in „Ges. Pflanzen“, 6, 261—266, 1954.
- (8) Bruns, H.: „Beeinflussung der Kokondite einer Population der Kleinen Fichtenblattwespe (*Lycaonematus abietum*) durch die Rote Waldameise (*Formica rufa*)“ in „Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutz“, Braunschweig, 6, 33—35, 1951.
- (9) Bruns, H.: „Neue Möglichkeiten des forstlichen Vogelschutzes gegen den Buchenrotschwanz (*Dasychira pudibunda*)“ in „Allg. Forstzeitschr.“, 9, 498—500, 1951.
- (10) Bruns, H.: „Fortschritte im forstlichen Vogelschutz“ in „Anz. f. Schädlingskde.“, 28, 51—57, 1955.
- (11) Collyer, E. u. Kirby, A. H. M.: "Some factors affecting the balance of phytophagous and predaceous mites on apple in south-east England" in "J. Hort. Sci.", 30, 97—108, 1955.
- (12) Cramer, H. H.: „Der Stand unseres Wissens über die Aus-wirkung großflächiger Schädlingsbekämpfung auf Waldbiozöosen. Sammelbericht über den Stand des Wissens“ in „Zeitschr. Pflan-zenkrankh.“, 62, 422—435, 1955.
- (13) Dosse, G.: „Aus der Biologie der Raubmilbe *Typhlodromus cucumeris* Oud. (Acar., Phytoseiidae)“ in „Zeitschr. Pflanzen-krankh.“, 62, 593—598, 1955.
- (14) Dosse, G.: „Über die Bedeutung der Raubmilben innerhalb der Spinnmilbenbiozöose auf Apfel. 1. Grundsätzliches aus der Biologie räuberischer Milben“, Vortrag 31. Dtsch. Pflanzensch.-Tagung, Kassel (1955) [im Druck].
- (15) Dreess, H.: „Beitrag zur Kenntnis des Auftretens gefährlicher phytopathogener Erreger und Parasiten“ in „Zeitschr. Pflanzen-krankh.“, 60, 83—86, 1953.
- (16) Franz, J.: „Neue Möglichkeiten und Ergebnisse der biologi-schen Schädlingsbekämpfung“ in „Mitt. Biolog. Zentralanstalt, Berlin-Dahlem“ (75), 12—22, 1953.
- (17) Franz, J.: „Zum Vorkommen und Massenwechsel der Tannen-stammlaus *Adelges (Dreyfusia) piceae* (Rag.) in Nordamerika und Europa“ in „Verh. Deu. Ges. f. angew. Ent.“ (1952), 117—124, 1954.
- (18) Franz, J.: „Möglichkeiten, Grenzen und Aufgaben der bio-logischen Schädlingsbekämpfung in Deutschland“ in „Anz. für Schädlingskde.“, 27, 97—102, 1951.
- (19) Franz, J.: „Probleme angewandter Vogelkunde“ in „J. f. Ornith.“, 95, 111—123, 1954.
- (20) Franz, J.: „Mikroben gegen Insekten. Neue Wege der bio-logischen Schädlingsbekämpfung“ in „Die Umschau“, 55, 209—211, 1955.
- (21) Franz, J.: „Die künstliche Verbreitung von Viren einiger Blattwespen (*Diprionidae*) innerhalb und außerhalb ihres Endemie-gebietes“ in „Verh. d. Deutschen Zool. Ges.“, Erlangen (1955) [im Druck].
- (22) Franz, J.: „Natürliche Feinde und Nährpflanze als biozöoti-sche Begrenzungsfaktoren bei Gradationen der Tannenstammlaus *Adelges (Dreyfusia) piceae*“, Vortrag 31. Dtsch. Pflanzensch.-Tagung, Kassel (1955) [im Druck].
- (23) Franz, J. u. Niklas, O. F.: „Feldversuche zur Bekämpfung der Roten Kiefernbuschhornblattwespe (*Neodiprion sertifer* [Geoffr.]) durch künstliche Verbreitung einer Virusseuche“ in „Nachrichtenblatt Deutsch. Pflanzenschutz“, Braunschweig, 6, 131—134, 1954.
- (24) Franz, J., Krieg, A. u. Langenbuch, R.: „Unter-suchungen über den Einfluß der Passage durch den Darm von Raubinsekten und Vögeln auf die Infektiosität insektenpatho-gener Viren“ in „Zeitschr. Pflanzenkrankh.“, 62, 721—726, 1955.
- (25) Gähler, H.: „Giftspritzungsmethode und ihre Entwick-lungsmöglichkeiten“ in „Anz. Schädlingskde.“, 24, 35—36, 1951.
- (26) Gößwald, K.: „Die Rote Waldameise im Dienste der Wald-hygiene“, Metta Kienau-Verlag, Lüneburg, 1951.
- (27) Gößwald, K.: „Beeinflussung des Geschlechtsverhältnisses durch Temperatureinwirkung bei *Formica rufa* L.“ in „Die Naturwiss.“, 42, 133—134, 1955.
- (28) Gößwald, K.: „Übersicht über die vom Institut für Ange-wandte Zoologie der Universität Würzburg durchgeführten Ver-mehrungen der Roten Waldameise“ in „Waldhygiene“, 1, 79—82, 1955.
- (29) Isseel, B. u. W.: „Versuche zur Ansiedlung von „Waldfleder-mäusen“ in Fledermäusekästen“ in „Forstwirtsch. Centralbl.“, 74, 193—204, 1955.
- (30) Karafiat, H.: „Neue Wege der Populationsanalyse an rinden-bewohnenden Arthropoden“ in „Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzensch.-Tagung“, Braunschweig, 7, 133—136, 1955.
- (31) Klein-Krauthelm, F.: „Zur Ökologie des Kartoffelkäfers, seine natürlichen Feinde und ihre Schädigung durch moderne Insektizide“ in „Mitt. Biolog. Zentralanstalt“, Berlin-Dahlem, (75), 37—41, 1953.
- (32) Kloft, W.: „Waldameisen und Pflanzenläuse“ in „Allg. Forst-zeitschr.“, 8, 529, 1953.
- (33) Krieg, A.: „Untersuchungen über die Polyedrose von *Neodiprion sertifer* (Geoffr.)“ in „Arch. f. d. ges. Virusforschung“, 6, 163—174, 1955.
- (34) Krieg, A.: „Licht- und elektronenmikroskopische Untersu-chungen zur Pathologie der „Lorscher-Erkrankung“ von Engerlingen und zur Zytologie der *Rickettsia melanothae* nov. spec.“ in „Zeitschr. Naturforsch.“, 10 b, 31—37, 1955.
- (35) Krieg, A.: „Über Infektionskrankheiten bei Engerlingen von *Melantha spec.* unter besonderer Berücksichtigung einer Micro-sporidien-Erkrankung“ in „Zentralbl. f. Bakt., Parasitenkde., Infektionskrankh. u. Hygiene“, 11. Abt., 108, 535—538, 1955.
- (36) Krieg, A.: „Zur Differenzierung von Virus-Krankheiten bei Insekten“ in „Mikroskopie“, Wien, 42, 609—610, 1955.
- (37) Krieg, K.: „Untersuchungen zur Wirbeltier-Pathogenität und zum serologischen Nachweis der *Rickettsia melanothae* im Arthropod-Wirt“ in „Naturwissenschaften“ (im Druck).

- (38) Krieg, A.: „Endogene Virusentstehung“ und Latenzproblem bei Insektenviren. Untersuchungen zur Polyedrose von *Neodiprion sertifer* (Geoffr.)“, II. Mitt. in „Arch. f. d. ges. Virusforsch.“ (im Druck).
- (39) Kuhn, R.: (Briefliche Mitteilung vom 2. 10. 1954).
- (40) Langenbuch, R.: „Methoden zur Prüfung von Pflanzenschutzmitteln. 58. Zwei sterilisierbare Zuchtgefäße für insektenpathologische Untersuchungen“ in „Nachrichtsblatt Deutsch. Pflanzenschutz“, Braunschweig, 6, 56-57, 1954.
- (41) Langenbuch, R.: „Eine verbesserte und zeitsparende Methode zur Färbung von Virusinclusionskörpern (Polyedern) in Schnittpräparaten mit Eisenhämatoxylin“ in „Mikroskopie“, Wien (im Druck).
- (42) Leih, E. u. Olschowy, G.: „Landschaftspflege und landwirtschaftliche Schädlingsbekämpfung“ in „Anz. Schädlingskd.“, 28, 145-150, 1955.
- (43) Löhr, H.: „Möglichkeiten und Grenzen des Vogelschutzes — als natürliche Schädlingsbekämpfung — im Obstbau“ in „Ornithol. Mitt.“, 6, 126-129, 1954.
- (44) Mathys, G.: „Massenauftritt von Spinnmilben als bioökologisches Problem“, Vortrag 31. Dtsch. Pflanzenschutztagung, Kassel (1955) [im Druck].
- (45) Mayer, Karl: „Das *Trichogramma*-Problem“ in „Nachrichtenblatt Deutsch. Pflanzenschutz“, Braunschweig, 7, 131-133, 1955.
- (46) Müller, E.: „Können Honigtau liefernde Baumläuse (*Lachnidae*) ihre Wirtspflanzen schädigen?“ in „Zeitschr. angew. Ent.“ (im Druck).
- (47) Müller-Kögler, E.: „Die ‚Lorscher Krankheit‘ der Maikäfererlinge“ in „Allg. Forstzeitschr.“, 9, 457-458, 1954.
- (48) Niklas, O. F.: „Untersuchungen über das Auftreten von Krankheiten und Schädigungen, insbesondere über die ‚Lorscher Seuche‘ (*Rickettsia melolonthae* Krieg) in Freilandpopulationen des Maikäfer-Ergerlings (*Melolontha spec.*)“ in „Zeitschr. Pflanzenschutz“ (im Druck).
- (49) Niklas, O. F.: „Die Erzwespe *Tetracampa diprioni* Ferrière als Eiparasit der Kiefernblattwespe *Neodiprion sertifer* (Geoffr.) [Hym.: Chalcidoidea — Hym.: Tenthredinidae]“ (im Druck).
- (50) Pfeifer, S.: „Ergebnisse zweier Versuche zur Steigerung der Siedlungsdichte der Vögel auf forstlicher Kleinfläche und benachbarter Großfläche“ in „Waldhygiene“, 1, 76-78, 1955.
- (51) Pfeifer, S.: „Experimentelle Untersuchungen und Freilandbeobachtungen zur Feststellung der Verteilung des Kartoffelkäfers (*Leptinotarsa decemlineata* Say.) durch mitteleuropäische Vogelarten“ in „Zeitschr. angew. Ent.“, 37, 447-461, 1955.
- (52) Pfeifer, S. u. Ruppert, K.: „Versuche zur Steigerung der Siedlungsdichte höhlen- und buschbrütender Vogelarten“ in „Biol. Abhandl.“, Heft 6, 1953.
- (53) Prickett, A. D. u. Patterson, N. A.: „The influence of spray programs on the fauna of apple orchards in Nova Scotia. IV. A review“ in „Canad. Entom.“, 85, 472-478, 1953.
- (54) Quednau, W.: „Über einige neue *Trichogramma*-Wirtse und ihre Stellung im Wirt-Parasit-Verhältnis. Ein Beitrag zur Analyse des Parasitismus bei Schlupfwespen“ in „Nachrichtenblatt Deutsch. Pflanzenschutz“, Braunschweig, 7, 145-148, 1955.
- (55) Rademacher, B.: „Die Bedeutung der Schafhaltung im Pflanzenschutz“ in „Südd. Schäferzeitung“, 43, 197-199, 1953.
- (56) Rademacher, B.: „Einfluß der Schafe auf die Larven des Klee-Luzernerwülfers. Einfluß einer Nachweide der Rübenfelder mit Schafen auf den Befall der Rüben mit *Cercospora*-Blattfleckenkrankheit.“ (Unveröffentlichter Bericht.)
- (57) Scherney, F.: „Untersuchungen über Vorkommen und wirtschaftliche Bedeutung räuberisch lebender Käfer in Feldkulturen“ in „Zeitschr. Pflanzenb. u. Pflanzenschutz“, 2, 19-73, 1955.
- (58) Schmittschek, E.: „Fragen der Waldhygiene“ in „Angew. Pflanzensoziologie“, Veröff. d. Kärntner Landesinst. f. angew. Pflanzensoziologie, Klagenfurt, Festschrift Aidingger, 2, 1011 bis 1020, 1954.
- (59) Schlöbitzky, E.: „Das Stuttgarter Insektarium zur Zucht von *Prospaltella perniciosi* Tow. (Hymenoptera)“ in „Zeitschr. Pflanzenschutz“, 62, 440-445, 1955.
- (60) Schlöbitzky, E.: „*Prospaltella perniciosi* — ein Beitrag zur biologischen Bekämpfung“, Vortrag 31. Dtsch. Pflanzenschutztagung, Kassel, 1955 (im Druck).
- (61) Schneider, F.: „Beziehungen zwischen Nützlingen und chemischer Schädlingsbekämpfung“ in „Verhandl. Deutsch. Ges. für angew. Ent.“ (1954), 18-29, 1955.
- (62) Schrader, G.: „Rückschau auf zwei Jahrzehnte Phosphorchemie“, Vortrag 31. Dtsch. Pflanzenschutztagung, Kassel, 1955 (im Druck).
- (63) Schütte, F.: „Untersuchungen über die Populationsdynamik des Eidenwicklers (*Tortrix viridana* L.)“, Diss., Münster, 1954 (Mskr.) [im Druck].
- (64) Schwerdtfeger, F.: „Grundzüge der Populationsdynamik der Tiere, insbesondere der Insekten“ in „Allg. Forst- u. Jagdzeitung“, 125, 200-209, 1954.
- (65) Schwerdtfeger, F.: „Bionozose und Pflanzenschutz“, Vortrag 31. Dtsch. Pflanzenschutztagung, Kassel, 1955 (im Druck).
- (66) Schweitulla, H.: „Untersuchungen zur biologischen Bekämpfung von *Lymantria dispar*, *Malacosoma neustria* und *Arctia caja*“, Dissertation, Zool. Inst. Köln, 1955.
- (67) Solomon, M. E.: „Das Gleichgewicht von Insektenbevölkerungen und die chemische Schädlingsbekämpfung. Schädlingsvermehrung als Folge von Insektizidbehandlung“ in „Zeitschr. angew. Ent.“, 37, 110-121, 1955. (Übersetzung der engl. Originalarbeit: „Insect population balance and chemical control of pests. Pest outbreaks induced by spraying“ in „Chemistry and Industry“, 1143-1147, 1953. Übersetzt von J. Franz.)
- (68) Steiner, H.: „Über den Einfluß chemischer Mittel auf die Insekten in Apfelmägen“, Vortrag 31. Dtsch. Pflanzenschutztagung, Kassel, 1955 (im Druck).
- (69) Steinhaus, E. A.: „The effects of disease on insect populations“ in „Hilgardia“, 23, 197-261, 1954.
- (70) Thalehorst, W.: „Probleme der biologischen Bekämpfung unserer einheimischen Forstschädlinge“ in „Allg. Forst- u. Jagdzeitung“, 125, 221-227, 1954.
- (71) Thielmann, K.: „Zur Problematik der neueren Entwicklung bei der Forstschädlingsbekämpfung“ in „Allg. Forstzeitschr.“, 10, 470-471, 1955.
- (72) Wellenstein, G.: „Neue Erfahrungen mit arsenfreien Fraßgiften in der Forstschädlingsbekämpfung“ in „Verh. Deutsch. Ges. angew. Entom.“ (1952), 148-156, 1954.
- (73) Wellenstein, G.: „Was können wir von der Roten Waldameise im Forstschutz erwarten?“ in „Beitr. Entom.“, 4, 117-138, 1954.
- (74) Wiersma, R.: „Der heutige Stand des Insektizid-Resistenzproblems“ in „Mitt. Biol. Bundesanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft“, (83), 17-37, 1955.
- (75) Yother, M. A.: „An annotated bibliography on *Aphelinus mali* (Hald.), a parasite of the woolly apple aphid“ in „U.S. Dep. Agric.“, Bureau Entom. Plant Quarantine, E-861, 1953.
- (76) Zobelstein, G.: „Zur Einwirkung neuer Insektenkampfstoffe auf Schlupfwespen“ in „Anz. Schädlingskd.“, 27, 33-34, 1954.
- (77) Zobelstein, G.: „Der Honigtau als Nahrung der Insekten“ in „Zeitschr. f. angew. Entom.“ (im Druck).
- (78) Zwölfer, W.: „Biologische und chemische Schädlingsbekämpfung. Vom Standpunkt des Forstschutzes gesehen“ in „Allg. Forstzeitung“, 8, 549-552, 1953.

Pflanzenschutzamt des Landes Schleswig-Holstein, Bezirksstelle für Pflanzenschutz Rellingen

Ein Beitrag zur Frage der Behandlung blühender Pflanzenbestände mit Insektiziden

Von Dipl.Biol. H. FABER

Bei der intensiven Bewirtschaftung unserer Kulturlandflächen wird es oft erforderlich, zur Vernichtung schädlicher Insekten Pflanzenbestände auch zur Zeit der Blüte mit insektenabtötenden Mitteln zu behandeln. Die meisten unserer Kulturpflanzen sind selbststeril und nur wenige selbstfertil. Sie sind auf Fremdbestäubung angewiesen, die — soweit nicht Windbestäubung in Frage kommt — von Insekten durchgeführt wird. Um also die Erträge zu sichern, müssen die nützlichen Insekten als Pollenüberträger geschont, die schädlichen Insekten als Ertragsminderer vernichtet werden. Hier ergibt sich eine Diskrepanz, die eine genaue Prüfung der Verhältnisse erforderlich macht, um zu entscheiden, ob eine Behandlung blühender Pflanzen mit insektenabtötenden Mitteln vertretbar ist.

Der wichtigste Bestäuber unserer Kulturpflanzen ist die Honigbiene. Die kurze Blütezeit in den ausgedehnten Monokulturen erfordert für die Pollenübertragung eine

große Anzahl von Insekten. Diese steht uns im Bienenvolk mit seinen unzähligen Arbeiterinnen zur Verfügung. Beim Besuch der Blüte bleibt Pollen an den feinen Borsten des Kopfes und Körpers der Biene hängen, der beim Herumkriechen der Biene in der nächsten Blüte mit der Narbe in Berührung kommt und abgestreift wird. So wird ein unfreiwilliger Pollentransport und damit die Befruchtung durchgeführt.

Aus der Erkenntnis heraus, daß zur Erhöhung der Erträge die Anwesenheit von Honigbienen unbedingt erforderlich ist, werden jährlich z. B. zur Zeit der Obstbaum- und Rapsblüte Tausende von Bienenvölkern in die hauptsächlichsten Anbaugelände geholt. In einigen Gebieten werden sogar für die Einwanderung Geldprämien an die Imker gezahlt. Um nun diese wertvollen Blütenbestäuber vor der Vernichtung durch unsachgemäße Anwendung von Insektiziden zu bewahren, wurde durch die Verordnung