

aus werden mehrfach angedeutet. — *Peipers* Schilderung der Exstirpation der Nebennieren ist außerordentlich klar und erschöpfend; auch sie berücksichtigt alle möglichen Versuchstiere, und zwar in eigenen Abschnitten und mit zeichnerischer Erläuterung der jeweiligen anatomischen Verhältnisse. — Bei der Technik der experimentellen Untersuchungen über die Zirbeldrüse hat *Walter Kolmer* ganz besonderen Nachdruck auf die vergleichende topographische Anatomie gelegt. Schematische Kopfskizzen zeigen die Lage bei den verschiedenen Tieren. — *Sigmund Fränkel* steuert Nachweis, Bestimmung und Darstellung der Inkrete der einzelnen Organe mit Einschluß der Abbaustudien und der Synthese bei. Nebenniere, Schilddrüse, Hoden. Magendarm, Placenta, Eierstock, Hypophyse, Milz sind einbezogen.

Das Heft ist für experimentell-chirurgische Weiterarbeit sehr wertvoll.
Georg Schmidt (München).

Berichtigung.

In dem Beitrag „**Sommer**, Coxa valga und Steilheit des Beckens in ihrer Beziehung zur Luxatio coxae“ in Band 187 dieser Zeitschrift muß es richtig heißen:

Seite 378 Zeile 10 Coxa valga statt Coxa vara,

.. 379 Abb. 2 in der Zeichnung ist rechts und links vertauscht, die Zahlen stehen richtig.
