

Sieht nur aus wie eine Varize ...

Die 64-jährige Frau bemerkt seit einigen Monaten eine schmerzlose Schwellung am linken Unterschenkel, die im Liegen verschwindet und sich im Stehen und Hocken mehr oder weniger stark hervorwölbt. Unter der Vermutung einer Krampfader bittet sie um Behandlung.

— Es handelt sich um den typischen Befund einer sogenannten Fettgewebshernie. Diese kleinen Hernien der Muskelfaszie der Fußheber befinden sich immer im Bereich der lateralen Unterschenkel, oft unmittelbar neben der Tibia. Zumeist treten sie in der Mehrzahl auf, häufig bilateral. Von Varizen unterscheiden sie sich durch die laterale Lokalisation (Perforansvenen befinden sich überwiegend am medialen Unterschenkel) sowie durch ihre kreisrunde Gestalt und normale Hautfarbe. Die Faszienlücke ist mit dem Finger gut tastbar, oft lokal druckdolent. Im Zweifelsfall räumt die Duplexsonografie differenzialdiagnostische Unsicherheiten aus.

Die Aufklärung beruhigt den Patienten, eine Behandlung ist nicht erforderlich.

Keyword: lower limb fascial hernia

■ Priv.-Doz. Dr. med. Uwe Müller-Bühl,
Bürgerstraße 16,
D-76133 Karlsruhe



Fotos (2): U. Müller-Bühl



Ihr besonderer Fall?

Sicher sehen auch Sie ab und an einen besonders eindrucksvollen Befund in Ihrer Praxis. Fotografieren Sie ihn, schreiben Sie uns unter dem Stichwort Blickdiagnose, bei Veröffentlichung erhalten Sie 100 Euro.

MMW-Fortschritte der Medizin
E-Mail: manhart@urban-vogel.de
Fax: 089/4372-1420

Weitere interessante Blickdiagnosen
finden Sie in unserem
Online-Archiv unter www.mmw.de.