

Was ist das für eine Kugel?

Junger Mann mit dickem Hals

Ein 14-jähriger Patient kam in die Sprechstunde und berichtete über eine nicht schmerzhaftige Schwellung im Bereich der Halsmitte seit vier Wochen.



Foto: A. Leunig

— Klinisch zeigt sich eine gegen Haut- und Weichteile, jedoch nicht gegen das Zungenbein verschiebliche prallelastische kugelige Raumforderung. Klinisch liegt das typische Bild einer medianen Halszyste vor. Differenzialdiagnostisch muss auch an eine Dermoidzyste, ektopes Schilddrüsengewebe oder an einen Lymphknotenabszess gedacht werden. Die Diagnose erfolgt klinisch sowie über Ultraschall mit Flüssigkeitsnachweis in der Zyste. Die Therapie der Wahl stellt immer die vollständige operative Entfernung der Zyste mit Resektion des medialen Anteils des Zungenbeinkörpers dar. Bei vollständiger Entfernung treten in der Regel keine Rezidive auf.

Keywords: cervical cyst

◦ Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Leunig, HNO-Klinik, Klinikum Großhadern, Ludwig-Maximilians-Universität, Marchioninistraße 15, D-81377 München

Ihr besonderer Fall?

Sicher sehen auch Sie ab und an einen besonders eindrucksvollen Befund in Ihrer Praxis. Fotografieren Sie ihn, schreiben Sie uns unter dem Stichwort Blickdiagnose, bei Veröffentlichung erhalten Sie 100 Euro.

MMW-Fortschritte der Medizin
E-Mail: manhart@urban-vogel.de
Fax: 089/4372-1420

Weitere interessante Blickdiagnosen finden Sie in unserem Online-Archiv unter www.mmw.de.