Introduction*

Les limites de cette Table Ronde

Introduction - The limits of this Round Table

J. Hummer et G. Gacon

34, rue Gambetta, F-54000 Nancy, France

Les rapporteurs de la table ronde sur les prothèses de hanche ont limité cette étude à des implantations réalisées avant l'âge de 50 ans et avec un recul de suivi post-opératoire d'au moins 3 ans.

Il est apparu nécessaire de savoir si le jeune âge des patients modifiait sensiblement certains paramètres :

- type d'implant avec ou sans ciment,
- courbe de survie des implants,
- complications,
- délai, fréquence et modalité des reprises chirurgicales...

Il est apparu important aux rapporteurs de confronter la série

disparate du GECO (implants de différents types avec un nombre important de chirurgiens poseurs) à des séries personnalisées sur un modèle unique posé par différents chirurgiens ou sur une expérience de modèles variés posés par le même chirurgien.

La durée de vie variable des implants rend difficile l'exploitation statistique des résultats.

S'il peut paraître prétentieux d'espérer régler tous les problèmes liés à la prothèse avant 50 ans, il apparaît possible de définir certaines orientations thérapeutiques consensuelles sur ce thème.

The participants in the round table on hip prostheses limited this study to implants performed under age 50 with a post-operative follow-up of at least 3 years.

It appeared necessary to know if the young age of the patients modified sensitively certain parameters :

- type of implant with or without cement,
- follow-up curve of implants,
- complications,
- delay, frequency and modality of revision surgery...

It appeared important to the participants to confront the

GECO series (various types of implants with a number of operating surgeons) to customized series on a unique model inserted by different surgeons or on an experiment of varied models inserted by the same surgeon.

The variable life span of the implants makes the statistical analysis of the results difficult.

If it may appear pretentious to hope to solve all the problems linked to prostheses before the age of 50, it appears possible to define certain agreed therapeutic approaches on this subject.