coloproctology 2021 · 43:46–50
<https://doi.org/10.1007/s00053-020-00505-1>
 Online publiziert: 26. November 2020
 © Der/die Autor(en) 2020

J. Müller · C. Müller · G. Loske

Klinik für Allgemein- Viszeral- und Thoraxchirurgie, Marienkrankenhaus Hamburg, Hamburg, Deutschland

Getunnelte subkutane endoskopische Unterdrucktherapie

Neue Therapieoption bei komplizierter Wundheilungsstörung am Stoma

Die Umwandlung eines doppelläufigen in ein endständiges Kolostoma geht häufig mit einer Verkleinerung des Faszien-durchtritts sowie der Hautwunde einher.

An dem Stoma können Wundheilungsstörungen entstehen, welche durch die Stuhlkontamination schwierig zu behandeln sind [2]. Bei einer Stomarückverlegung kann die kutane Unterdrucktherapie dazu beitragen, das Risiko einer Wundheilungsstörung zu verringern [1, 4].

In diesem Beitrag wird eine neue chirurgisch-endoskopische Methode der Unterdrucktherapie zur Behandlung einer komplizierten Wundheilungsstörung an einer stomalen Wunde vorgestellt. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung der konventionellen Unterdrucktherapie, welche sich zur Wundbehandlung bereits fest etabliert hat [3, 5, 6]. Ergänzend werden die Techniken der endoskopischen Unterdrucktherapie entlang eines subkutan getunnelten Zugangswegs eingesetzt, um die Wundheilung herbeizuführen.

In dieser Fallvorstellung handelt es sich um eine 69-jährige Patientin mit einem stenosierenden Adenokarzinom des Rektums (T3 N1 M0). Als wesentliche Begleiterkrankungen sind eine arterielle Hypertonie und ein Diabetes mellitus Typ 2 zu nennen.

Nach Beschluss des interdisziplinären Tumorboards erfolgte initial die Anlage eines doppelläufigen Descendostomas. Nach neoadjuvanter Therapie erfolgte die geplante Rektumresektion als Hartmann-Situation mit endständigem

Descendostoma. Hierfür wurde der Stomadurchtritt des vormals doppelläufigen Stomas genutzt und hierzu verkleinert.

Unmittelbar an der Naht des Stomas zeigte sich 7 Tage postoperativ eine Wundheilungsstörung mit stuhli-ger Kontamination und abszedierender Entzündung. Ein haftfähiger Untergrund für die Stomaplatte war somit im Wundbereich nicht gegeben. Die Folge war eine permanente Stuhlkontamination sowohl an der Stomawunde als auch an der Medianlaparotomie. Hautmazerationen der Wundumgebung mit hohem pflegerischem Aufwand bildeten eine weitere typische Folge der Komplikation.

Material und Methoden

Material

Es wurden drei unterschiedliche Schlauchdrainagen verwendet, welche sich in dem offenporigen Drainageelement (DE) unterscheiden (Abb. 1).

Offenporige Polyurethanschwamm-drainage (OPD). Am distalen Ende eines Drainageschlauches (Ventrol, Ch 16, 120 cm, Mallinckrodt Medical, Irland) wurde ein offenporiger Polyurethan (PU)-Schwamm (V.A.C. GranuFoam, KCI Inc. San Antonio, USA; Endo-SPONGE® B. Braun, Melsungen, Deutschland) befestigt.

Folienummantelte OPD (OPFD). Die OPD wurde mit einer offenporigen dünnen, doppelagige Drainagefolie (Su-

prasorb CNP, Drainage Film; Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, Rengsdorf, Germany) ummantelt.

Offenporige Foliendrainage (OFD). Der distale Drainageschlauch wurde einmalig mit der Drainagefolie umwickelt.

Die Drainagetypen unterscheiden sich wesentlich im DE-Durchmesser. OPD und OPFD haben voluminöse, durchmesserstarke Drainageelemente, die chirurgisch-endoskopisch in die Wunde eingebracht werden müssen. OFD haben nur einen Durchmesser von wenigen Millimetern, diese können endoskopisch ohne erneute Wundöffnung eingeführt werden. Folienbasierte DE haften weniger fest am Wundgrund und lassen sich leichter entfernen.

Methode

Bei der subkutanen getunnelten endoskopischen Unterdrucktherapie (ST-EUT) wird der Drainageschlauch der in der Wunde einliegenden Schlauchdrainage über eine wundferne Inzision ausgeleitet. Die Wunde wird mittels chirurgischer Naht über dem DE verschlossen und ein Unterdruck von –125 mm Hg mit kontinuierlichem Sog angelegt (KCI V.A.C. Freedom, Activac KCI USA Inc., San Antonio, Texas, USA).

Der Drainagekanal wird als endoskopischer Zugangsweg genutzt, die Drainage im Abstand von 3 bis 4 Tagen gewechselt. Die Wunde wird hierbei endoskopisch inspiziert und der Wundheilungsverlauf begutachtet.

Abb. 1 ▲ Verwendetes Material (v.l.n.r.): OPD (offenporige Polyurethanschwammdrainage), OPFD (OPD mit offenporiger doppelagiger Drainagefolie ummantelt), OFD (dünne offenporige Foliendrainage), Endoskop

Abb. 2 ▲ Einbringen einer neuen Drainage, Ummanteln mit offenporiger doppelagiger Drainagefolie

Abb. 3 ▲ OPFD vor der Platzierung in der Wunde

Abb. 4 ▲ Endoskopische Kontrolle des Wundkanals, Granulationsgewebe mit typischem Ansaugmuster durch die folienbasierte Drainage

Die ST-EUT beginnt mit einer OPD, wechselt auf die OPFD und letztlich auf die dünne OFD. Ziel ist es, durch die im Durchmesser kleiner werdenden Drainagen die Wunde schrittweise so weit zu verkleinern, dass die ausschließliche endoskopische Behandlung ohne erneute chirurgische Wunderröffnung möglich ist.

Diese chirurgisch-endoskopische Wundbehandlung lässt sich in 3 Schritte unterteilen:

1. Nach der initialen Wunderröffnung wurde die OPD in die Wunde eingebracht und der Drainageschlauch

wundfern über eine Stichinzision ausgeleitet. Die Wunde wurde über der OPD mittels Naht chirurgisch verschlossen und ein Vakuum von -125 mm Hg etabliert (V.A.C. Free-dome, KCI Inc. San Antonio, USA).

2. Nach 3 Tagen erfolgte der Systemwechsel der OPD auf die folienummantelte OPFD (mit einem Durchmesser von min. 15 mm); hierfür musste die Wunde eröffnet werden (Abb. 2 und 3), da der Schwammdurchmesser für eine endoskopische Platzierung zu groß ist. Der Verbandswechsel ist notwendig,

um eine sukzessive Wundverkleinerung zu erreichen. Die alte Drainage wurde entfernt, die OPFD mit neuem Drainageschlauch eingebracht und die Wunde wieder mittels Naht verschlossen. Die OPFD hat eine geringe Ansaugwirkung und führte durch die kleinere Abmessung ebenfalls zu einer Wundverkleinerung.

3. Nach weiteren 3 Tagen wurde die kleinlumige OFD eingebracht; hier war letztmalig eine Wunderröffnung notwendig. Die OPFD wurde durch die wiedereröffnete Wunde entfernt. Die OFD konnte nun durch den Tun-

Getunnelte subkutane endoskopische Unterdrucktherapie. Neue Therapieoption bei komplizierter Wundheilungsstörung am Stoma**Zusammenfassung**

Einleitung. Bei einer 69-jährigen Patientin kam es nach Umwandlung eines doppelläufigen in ein endständiges Kolostoma zu einer Wundheilungsstörung, welche aufgrund der Nähe zum Stoma schwer zu behandeln war. Wir entwickelten eine getunnelte subkutane endoskopische Unterdrucktherapie, um die Wunde verschlossen zu halten, sodass eine uneingeschränkte Funktion des Stomas möglich blieb.

Methode. Es wurden drei verschiedene offenporige Schlauchdrainagen verwendet. An das distale Ende einer Magensonde wurde entweder ein offenporiger PU-Schwamm (OPD), eine dünne, doppelagige Drainagefolie (OFD) oder ein mit der Drainagefolie umhüllter PU-Schwamm (OPFD) mittels Naht fixiert. Diese Drainagetypen unterscheiden sich im Durchmesser sowie in der Ansaugwirkung auf das Wundgewebe. Der parastomale

Abszess wurde chirurgisch eröffnet und gespült. Daraufhin konnte der offenporige PU-Schwamm in die Wunde eingebracht werden. Der Unterdruckschlauch wurde über eine kleine Inzision wundfern ausgeleitet. Nach Wundverschluss per Naht konnte die Stomaplatte problemlos aufgeklebt werden. Ein Vakuum mit –125 mm Hg wurde etabliert. Die weiteren Verbandswechsel beinhalteten eine endoskopische Inspektion. Bei den erstmaligen Verbandswechseln von großporiger OPD und kleinporiger OPFD musste die Wunde neu eröffnet und wieder chirurgisch verschlossen werden. Bei sauberen, granulierenden Wundverhältnissen wurde das Verbandsregime auf die kleinlumige OFD rotiert. Dieser Drainagetyp konnte ausschließlich endoskopisch gewechselt werden, eine weitere Wundöffnung war nicht mehr notwendig.

Ergebnis. Durch die OPD konnte initial ein großflächiges Débridement und eine Wundverkleinerung erreicht werden, die Wunde musste für die Verbandswechsel jedoch wiedereröffnet werden. Auch bei der folgenden OPFD wurde die Wunde für den Verbandswechsel erneut eröffnet. Die doppelagige Folie um den PU-Schwamm führte hier zu einer geringeren Ansaugwirkung. Letztlich wurde mit der OFD eine rein endoskopisch zu versorgende Drainage etabliert, die keine weitere Manipulation an der Haut erforderte. Nach 16 Tagen endete die Therapie mit einer ausgeheilten Wunde und problemloser Stomaversorgung.

Schlüsselwörter

Vakuumtherapie · Wundheilungsstörung · Endoskopie · Stoma · Abszess

Tunneled subcutaneous endoscopic negative pressure treatment. New treatment option for complicated surgical site infection of a stoma**Abstract**

Introduction. A 69-year-old female patient suffered a surgical site infection of the colostomy after surgery. The infection was difficult to treat due to the close proximity to the stoma. We developed a subcutaneous endoscopic negative pressure treatment to keep the wound closed so that an unimpaired function of the colostomy was possible.

Method. A total of three different types of drainage were used. At the distal end of a nasogastric tube either an open pore PU-sponge (OPD), a thin double layered drainage film (OFD) or a PU-sponge covered with a drainage film (OPFD) was fixed with a suture. These forms of drainage differed in diameter and the suction effect on the wound tissue. The parastomal abscess was surgically opened and rinsed. Then, the open pore PU-sponge

was inserted into the wound and the negative pressure tube was drained away from the wound via a small incision. The wound was surgically closed with a suture and the stoma plate could be easily attached. A vacuum with –125 mm Hg was established. Regular change of dressings was accompanied by endoscopic inspection of the wound cavity to monitor healing. At the first change of dressing from large pore OPD or to small pore OPFD the wound had to be reopened and surgically closed again. Under clean granulating wound conditions the dressing regimen was rotated to the small pore OFD. This type of drainage could be renewed purely endoscopically without requiring reopening of the wound. **Result.** Initially, an extensive debridement and reduction of the wound could be achieved by

the OPD; however, changing of the drainage was possible only by reopening the wound. The subsequent OPFD still needed the wound to be reopened but due to the double-layered film around the PU-sponge, the attachment to the wound base was less intense. Finally, the OFD was installed and renewed purely endoscopically so that further manipulation of the skin was not necessary. After 16 days the treatment was complete with a fully functional colostomy and no further treatment was needed.

Keywords

Surgical site infection · Stoma · Vacuum assisted closure · Endoscopy · Incisional negative pressure wound therapy

nel unter endoskopischer Kontrolle (**Abb. 4**) eingebracht und gewechselt werden. Die Hautwunde wurde final verschlossen. Für die weiteren Wechsel der OFD konnte die Wunde verschlossen bleiben, der Drainagewechsel erfolgte endoskopisch. Die OFD wurde dreimal endosko-

pisch erneuert mit einer gesamten Therapiedauer von 10 Tagen.

Die Untersuchungen erfolgten in der Endoskopie mit Sedierung nach S3-Leitlinie. Sämtliche Prozeduren wurden unter sterilen Kautelen durchgeführt.

Ergebnis

Bei dem vorliegenden parastomalen Abszess wurde die Hautwunde zunächst chirurgisch eröffnet, gespült und ein Abstrich entnommen, die Faszie blieb intakt.

Abb. 5 ◀ Stoma-
platte, rechts der
wundferne ausge-
leitete Drainage-
schlauch

Die initiale dreitägige OPD-Behandlung führte zu einem großflächigen Débridement und zur Wundverkleinerung, dazu wurde die Wunde zum Verbandwechsel eröffnet. Auch bei der dreitägigen OPD-Behandlung musste die Wunde zum Systemwechsel erneut eröffnet werden; die Bindung zum Wundgrund durch die Vakuumfolie ist hierbei geringer, die Wunde kann sich so verkleinern. Letztlich konnte die OPD eingebracht werden, welche endoskopisch erneuert wurde. Eine weitere Hautmanipulation war nicht notwendig. Die gesamte Therapie hatte keine Auswirkungen auf die orale Ernährung und beeinflusste nicht die Funktion und Versorgung des Kolostomas (■ **Abb. 5**).

Die gesamte Therapie der Wundheilungsstörung erfolgte über 16 Tage. Insgesamt erfolgten 6 subkutane Endoskopien und 5 Drainageanlagen.

Diskussion

In dem vorliegenden Fall war die endoskopische, getunnelte Unterdrucktherapie erfolgreich, insbesondere die Stuhlkontamination der Wunde blieb bei ungestörter Funktion des Stomas aus. Hiermit ging die normale orale Ernährung der Patientin einher.

In Abhängigkeit von den verwendeten Schlauchdrainagen kann bei den Drainagewechseln auch eine erneute Wunderöffnung der Wunde notwendig sein. In unserem Fallbeispiel war dieses zweimal erforderlich, eine Heilungsstörung der Haut trat jedoch nicht auf. Die Wunder-

öffnung kann auch für ein konventionelles chirurgisches Débridement genutzt werden. Nach erneutem Einbringen der Schlauchdrainage und wundferner Ausleitung wird die Wunde chirurgisch verschlossen. Der chirurgische Wundverschluss ermöglicht den Unterdruckaufbau im Wundbett, ohne dass eine Abklebung mit einer Okklusionsfolie erfolgen muss. Schrittweise wird die Wunde kontinuierlich verkleinert, sodass im Laufe der Therapie und unter Verwendung neuer kleinumiger OFD die Behandlung ausschließlich endoskopisch ohne erneute Wunderöffnung durchgeführt werden kann.

Das neue Verfahren kann als Alternative zu offen-chirurgischen Revisionen mit ggf. Neuanlage des Stomas an anderer Stelle angewendet werden.

Fazit für die Praxis

- Durch wundferne Drainageausleitung kann das Stoma uneingeschränkt verwendet werden.
- Der Heilungsverlauf lässt sich endoskopisch kontrollieren.
- Eine orale Nahrungsaufnahme ist problemlos möglich.
- Es ist keine weitere Operation notwendig.
- Die getunnelte endoskopische Unterdrucktherapie ist eine minimal-invasive Alternative zur Behandlung des parastomalen Abszesses.

Korrespondenzadresse

Dr. med. J. Müller
Klinik für Allgemein- Viszeral-
und Thoraxchirurgie,
Marienkrankenhaus Hamburg
Alfredstraße 9, 22087 Ham-
burg, Deutschland
mueller21.ach@
marienkrankenhaus.org

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. J. Müller und C. Müller geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht. G. Loske ist als Berater für die Firma Lohmann & Rauscher GmbH und Co. KG tätig.

Alle beschriebenen Untersuchungen am Menschen oder an menschlichem Gewebe wurden mit Zustimmung der zuständigen Ethikkommission, im Einklang mit nationalem Recht sowie gemäß der Deklaration von Helsinki von 1975 (in der aktuellen, überarbeiteten Fassung) durchgeführt. Dieser Beitrag beinhaltet keine Studien an Menschen und Tieren. Es handelt sich um einen individuellen Heilversuch, zu dem die Patientin einwilligte. Für Bildmaterial oder anderweitige Angaben innerhalb des Manuskripts, über die Patienten zu identifizieren sind, liegt von ihnen und/oder ihren gesetzlichen Vertretern eine schriftliche Einwilligung vor.

Open Access. Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.

Literatur

1. Cantero R, Rubio-Perez I, Leon M, Alvarez M, Diaz B, Herrera A et al (2016) Negative-pressure therapy to reduce the risk of wound infection following diverting loop ileostomy reversal: an initial study. *Adv Skin Wound Care* 29:114–118
2. Klink CD, Wunschmann M, Binnebosel M, Alizai HP, Lambert A, Boehm G et al (2013) Influence of skin closure technique on surgical site infection

- after loop ileostomy reversal: retrospective cohort study. *Int J Surg* 11:1123–1125
3. O'Leary DP, Peirce C, Anglim B, Burton M, Concanon E, Carter M et al (2017) Prophylactic negative pressure dressing use in closed laparotomy wounds following abdominal operations: a randomized, controlled, open-label trial: The P.I.C.O. Trial. *Ann Surg* 265:1082–1086
 4. Poehnert D, Hadelar N, Schrem H, Kaltenborn A, Klempnauer J, Winny M (2017) Decreased superficial surgical site infections, shortened hospital stay, and improved quality of life due to incisional negative pressure wound therapy after reversal of double loop ileostomy. *Wound Repair Regen* 25:994–1001
 5. Sandy-Hodgetts K, Watts R (2015) Effectiveness of negative pressure wound therapy/closed incision management in the prevention of post-surgical wound complications: a systematic review and meta-analysis. *JBHI Database System Rev Implement Rep* 13(1):253–303
 6. Schorsch T, Müller C, Loske G (2014) Endoskopische Vakuumtherapie von Perforationen und Anas-tomosensuffizienzen des Ösophagus. *Chirurg* 85:1081

Buchbesprechung

S.F. Schoppmann, M. Riegler

Multidisciplinary Management of Gastroesophageal Reflux Disease

Das multidisziplinäre Management der Gastroösophagealen Refluxkrankheit

Springer International Publishing 2021, 1. Auflage, 217 S., 19 s/w Abbildungen, 66 farbige Abbildungen Abb., (ISBN: 978-3-030-53750-0), Hardcover 145,59 EUR

Die gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) zählt heute zu den häufigsten Lebensstilerkrankungen. Diagnose und Behandlung dieser Erkrankung stellen eine beträchtliche Herausforderung dar und erfordern einen multidisziplinären Ansatz. Das vorliegende Werk wurde von zwei hervorragenden GERD-Experten herausgegeben, Sebastian F. Schoppmann und Martin Riegler, gemeinsam mit weiteren herausragenden, weltweit anerkannten Koautoren. In diesem Buch wird ein klarer und umfassender Überblick zum gegenwärtigen Stand des multidisziplinären GERD-Managements geboten. Es

werden alle Aspekte der Diagnose und des Managements der GERD, inklusive Endoskopie, Gastroenterologie, Radiologie, Pulmologie, Chirurgie, Palliation und interventionellen Medizin, auf hohem Niveau präsentiert und diskutiert. Darüber hinaus werden anatomische, physiologische, histopathologische und pathophysiologische Charakteristika des Ösophagus aufgezeigt. Multi- und interdisziplinäre Ansätze zur GERD und zum Barrett-Ösophagus (BE) einschließlich der neuesten Erkenntnisse im Verständnis dieser Erkrankungen, wie auch Überlegungen zu rezenten diagnostischen und therapeutischen Verfahren werden abgedeckt. Die fundierte Expertise der Autoren und hochpräzise Literaturrecherche erlaubt die Darstellung aller derzeit bekannten Aspekte der GERD und des BE auf hohem Niveau. Insbesondere wird durch die Präsentation neuester Methoden in der Therapie das breite Spektrum des heute zur Verfügung stehenden Behandlungsinstrumentariums demonstriert und damit das Tor zu einer individualisierten Therapie geöffnet.

In Abschnitt 1 wird die Pathophysiologie von Verletzungen des unteren Ösophagussphinkters dargestellt und ein neues pathologisches Testverfahren für derartige Verletzungen präsentiert. Abschnitt 2 umfasst detaillierte Informationen zur ösophagealen Funktionstestung auf GERD. Die Abschnitte 3 und 4 behandeln die Endoskopie und endoskopische ablativen Therapien bei GERD und BE. Es werden die endoskopische Mukosaresektion, die endoskopische Submukosadisektion, die Radiofrequenzablation sowie die Kryoballonablation beschrieben. Die dazugehörigen Diagramme und Abbildungen helfen, die diversen Verfahren auch für den Nichtspezialisten verständlich zu machen. Aktuelle Studien zum endoskopischen Management der GERD und des BE werden besprochen. In Abschnitt 5 wird auf die Bedeutung der Bildgebung für die Diagnose und Darstellung zusätzlicher Pathologien vor Durchführung einer Antirefluxchirurgie eingegangen – sowie auf ihren Wert in der Diagnose von Früh- und Spätkomplikationen. Abschnitt 6 ist den diversen extraösophagealen Manifestationen der GERD gewidmet, u.a. dem chronischen Husten, dem Globussyndrom, der Heiserkeit, dem Stimmlippengranulom und der Stimmlippendysfunktion und der chronischen Rhinosinusitis. Chirurgisch orientierte Leser werden über die Abschnitte 7 bis 10 erfreut sein. Begleitet von eindrucksvollen Abbildungen werden im Text die verschiedenen Verfahren der Fundoplicatio vorgestellt. Insbesondere wird im achten Abschnitt eines der neuartigen Instrumente in der GERD-Therapie präsentiert. Hier wird auf die Technik und Evidenz der magnetischen Sphinkteraugmentation eingegangen. Abschnitt 11 ist der Diagnose des Barrett-Karzinoms unter Einsatz diverser bildgebender Techniken gewidmet. Zu guter Letzt gibt es zwei Kapitel zum ösophagealen Adenokarzinom, einschließlich der chirurgischen Behandlung und Palliation. Die ausgezeichnete Editierung wird durch aktuelle Literaturübersichten, Tabellen, hochqualitative Abbildungen und ein Stichwortverzeichnis bereichert. Zusammenfassend präsentiert dieses Werk alle Aspekte des multidisziplinären Managements der gastroösophagealen Refluxerkrankung, einschließlich neuartiger diagnostischer und therapeutischer Konzepte und Strategien. Dieses Buch ist eine wertvolle Ergänzung für die Bibliothek jedes Mediziners, der sich mit diesem Thema beschäftigt.

H. Hauser (Graz, Österreich)