Anaesthesist 2020 · 69:73

<https://doi.org/10.1007/s00101-019-00720-6>

Online publiziert: 19. Dezember 2019

© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019

I. Wolff

Facharztzeitschriftenredaktion Der Anaesthesist, Springer Medizin Verlag GmbH, Heidelberg, Deutschland

Editorial Hinweis zu: Hämodynamische Effekte verschiedener Hydroxyäthylstärke-Lösungen bei kardiochirurgischen Patienten **_ZURÜCKGEZOGEN**

Die Schriftleitung von *Der Anaesthesist* zieht hiermit den Artikel [1] auf Grundlage einer Untersuchung der Justus-Liebig-Universität Gießen im Hinblick auf gefälschte Daten und der darauf folgenden Empfehlung zurück.

Der Korrespondenzautor J. Boldt hat auf die Kontaktaufnahme der Schriftleitung und des Verlags in dieser Sache nicht reagiert. Die weiteren Autoren D. Kling, B. Zickmann, M. Mühlhause, F. Dapper und G. Hempelmann konnten aufgrund der zeitlichen Differenz nicht mehr auffindig gemacht werden.

Der Beitrag ist in PubMed mit der Nummer PMID: 1689558 hinterlegt.

Korrespondenzadresse

Dr. I. Wolff

Facharztzeitschriftenredaktion
Der Anaesthesist,
Springer Medizin Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg,
Deutschland
ines.wolff@springer.com

Literatur

1. Boldt J, Kling D, Zickmann B, Mühlhause M, Dapper F, Hempelmann G (1990) The hemodynamic effects of various hydroxyethyl starch solutions in heart surgery patients. *Anaesthesist* 39:6–12