Anaesthesist 2021 · 70:548
<https://doi.org/10.1007/s00101-021-00981-0>
Online publiziert: 2. Juni 2021
© Der/die Autor(en) 2021

Mark Michael¹ · Noemi Freise² · Verena Keitel² · Andreas Schaper³ ·
Christian Plettenberg⁴ · Sven Dreyer⁵ · Michael Bernhard¹

¹ Zentrale Notaufnahme, Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland

² Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie, Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland

³ Giftinformationszentrum-Nord, Universitätsmedizin Göttingen, Göttingen, Deutschland

⁴ Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland

⁵ Hyperbare Sauerstofftherapie, Universitätsklinikum Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland

Erratum zu: Akzidentelle Atemkalkingestion im Rahmen eines Tauchganges

Erratum zu:

Anaesthesist 2021

<https://doi.org/10.1007/s00101-021-00920-z>

In der Zusammenfassung des zuerst publizierten Artikels wurde die Zusammensetzung des Atemkalks nicht korrekt dargestellt. Bestandteile des Atemkalks sind Kalziumhydroxid und Natronlauge (NaOH). Hydroxycarbamid ist ein zytostatisch wirkendes Arzneimittel.

Der vollständige und korrigierte Artikel steht Ihnen auf www.springermedizin.de (Abb. 1) zur Verfügung. Bitte geben Sie dort den Beitragstitel in die Suche ein.

Korrespondenzadresse

Dr. med. Mark Michael

Zentrale Notaufnahme, Universitätsklinikum
Düsseldorf

Moorenstraße 5, 40225 Düsseldorf,
Deutschland

Mark.Michael@med.uni-duesseldorf.de

Abb. 1 ▲ QR-Code zum korrigierten Artikel

Die Online-Version des Originalartikels ist unter
<https://doi.org/10.1007/s00101-021-00920-z>
zu finden.