Anaesthesist 2021 · 70 (Suppl 1):S78–S79
<https://doi.org/10.1007/s00101-021-00985-w>
 Online publiziert: 21. Juni 2021
 © Der/die Autor(en) 2021

Michael Bauer¹ · Heinrich Volker Groesdonk² · Franziska Preissing³ ·
 Petra Dickmann¹ · Tobias Vogelmann⁴ · Herwig Gerlach⁵

¹ Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Universitätsklinikum Jena, Jena, Deutschland

² Klinik für Interdisziplinäre Intensivmedizin und Intermediate Care, Helios Klinikum Erfurt, Erfurt, Deutschland

³ CytoSorbents Europe GmbH, Berlin, Deutschland

⁴ LinkCare GmbH, Stuttgart, Deutschland

⁵ Klinik für Anästhesie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie, Vivantes Klinikum Neukölln, Berlin, Deutschland

Erratum zu: Sterblichkeit bei Sepsis und septischem Schock in Deutschland. Ergebnisse eines systematischen Reviews mit Metaanalyse

Erratum zu:

Anaesthesist 2021

<https://doi.org/10.1007/s00101-021-00917-8>

Die Autorinnen und Autoren weisen darauf hin, dass Daten zur 30-Tages-Sterblichkeit zu Sepsis in Deutschland nicht vollständig aus den genannten Studien extrahiert wurden.

Im *Abstract* muss es korrekterweise lauten „Insgesamt wurden 134 Studien in die Metaanalyse eingeschlossen. Die 30-Tages-Sterblichkeit bei Sepsis betrug in Deutschland 26,50 % (95 %-KI: 19,86–33,15 %), in Europa (ohne Deutschland) 23,85 % (95 %-KI: 20,49–27,21 %) und in Nordamerika 19,58 % (95 %-KI: 14,03–25,14 %)“.

Das *Ergebnis* wird wie folgt korrigiert „Die 30-Tages-Sterblichkeit bei Sep-

Die Online-Version des Originalartikels ist unter <https://doi.org/10.1007/s00101-021-00917-8> zu finden.

Abb. 2a ▲ 30-Tages-Sterblichkeit bei Sepsis, dargestellt je Region, in der die Studie durchgeführt wurde. Die Sterblichkeit wurde je Region gepoolt und unter Angabe des 95%-Konfidenzintervalls dargestellt

Abb. 3 ▲ Entwicklung der 30-Tages-Sterblichkeit bei Sepsis in Deutschland, verglichen mit Europa und Nordamerika über das letzte Jahrzehnt. (Die 30-Tages-Sterblichkeit bei Sepsis im Zeitverlauf wurde pro Jahr gepoolt und mittels linearer Regression für die Regionen Deutschland, Europa (außer Deutschland) und Nordamerika dargestellt. Die *durchgezogene Linie* stellt die Regressionsgerade für Deutschland dar, die *gepunktete* für Europa ohne Deutschland und die *gestrichelte Linie* für Nordamerika)

sis wurde für Deutschland auf 26,50 % (95 %-KI: 19,86–33,15 %) geschätzt. Das Heterogenitätsmaß I^2 von 95,97 zeigte eine hohe Heterogenität an. Diese Analyse basierte auf 10 Studien mit insgesamt 7674 Patienten“.

Der dritte Satz der Diskussion muss richtigerweise heißen „Für die Sepsis wurde eine 30-Tages-Sterblichkeit von 26,50 % ermittelt.“

Im *Fazit für die Praxis* korrigiert sich der erste Punkt zu „In Deutschland wurde die 30-Tages-Sterblichkeit bei Sepsis auf 26,50 % (95 %-KI: 19,86–33,15 %) geschätzt.“

■ **Abb. 2a und 3** sind korrigiert abgebildet.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med. Michael Bauer

Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin,
Universitätsklinikum Jena

Am Klinikum 1, 07747 Jena, Deutschland

michael.bauer@med.uni-jena.de

Open Access. Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.

Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.

Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>.