Bundesgesundheitsbl 2020 · 63:916–917
<https://doi.org/10.1007/s00103-020-03106-x>
Online publiziert: 2. März 2020
© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil
von Springer Nature 2020

Caroline Cohrdes · Kristin Göbel · Robert Schlack · Heike Hölling

Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring, Fachgruppe Psychische Gesundheit, Robert Koch-Institut, Berlin, Deutschland

Erratum zu: Essstörungssymptome bei Kindern und Jugendlichen: Häufigkeiten und Risikofaktoren

Erratum zu:

Bundesgesundheitsbl 2019

<https://doi.org/10.1007/s00103-019-03005-w>

Die Prävalenzangaben in **Tab. 1** der Originalpublikation zum Körperselbstbild sind in der Spalte „Gesamt“ nicht korrekt publiziert worden. Die korrigierte Tabelle ist im Folgenden dargestellt.

Korrespondenzadresse

Dr. Caroline Cohrdes

Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring, Fachgruppe Psychische Gesundheit, Robert Koch-Institut
General-Pape-Str. 62–66, 12101 Berlin, Deutschland
CohrdesC@rki.de

Die Online-Version des Originalartikels ist unter
<https://doi.org/10.1007/s00103-019-03005-w>
zu finden.

Tab. 1 Prävalenzen von Essstörungssymptomen nach SCOFF in KiGGS Welle 2 getrennt nach Altersgruppe (N = 6599 insgesamt; N = 1770 für Gewichtsstatus) und Ergebnisse aus unadjustierten logistischen Regressionen zur Identifikation signifikanter Unterschiede in der Prävalenz für die jeweiligen Risikofaktoren

	Altersgruppe		Gesamt		
	11–13 Jahre % (95 %-KI)	14–17 Jahre % (95 %-KI)	% (95 %-KI)	UOR (95 %-KI)	p
<i>Geschlecht</i>					
Jungen ^a	12,3 (10,0–15,0)	12,0 (9,9–14,4)	12,1 (10,6–13,8)	–	–
Mädchen	19,5 (16,8–22,5)	33,6 (30,6–36,7)	27,9 (25,6–30,3)	2,8 (2,3–3,4)	<0,01
<i>Bildungsstatus</i>					
Niedrig ^a	20,5 (15,6–26,5)	27,8 (22,7–33,6)	25,1 (21,2–29,3)	–	–
Mittel	16,3 (13,8–19,2)	22,6 (20,5–24,8)	20,0 (18,4–21,8)	0,7 (0,6–1,0)	0,02
Hoch	10,7 (8,7–13,2)	16,7 (13,8–20,1)	14,2 (12,3–16,3)	0,5 (0,4–0,6)	<0,01
<i>Migrationshintergrund</i>					
Ja ^a	18,5 (13,4–25,0)	30,4 (25,2–36,0)	26,3 (22,5–30,6)	–	–
Nein	15,3 (13,5–17,4)	20,9 (19,0–22,9)	18,6 (17,2–20,0)	0,6 (0,5–0,8)	<0,01
<i>Gewichtsstatus</i>					
Unter- oder Übergewicht	29,1 (20,4–39,6)	29,8 (22,5–38,2)	29,5 (23,8–35,9)	–	–
Normalgewicht ^a	9,8 (6,8–13,8)	24,6 (20,3–29,4)	18,8 (15,8–22,1)	1,6 (1,2–2,3)	<0,01
<i>Körperselbstbild</i>					
Genau richtig ^a	20,4 (16,2–25,4)	21,5 (17,7–25,9)	21,1 (18,3–24,3)	–	–
Ein bisschen zu dünn/dick	21,5 (16,1–28,0)	17,2 (13,6–21,4)	18,6 (15,6–22,0)	3,8 (3,1–4,7)	<0,01
Viel zu dünn/dick	58,1 (51,2–64,7)	61,3 (56,5–65,9)	60,3 (56,6–63,9)	10,6 (7,5–14,9)	<0,01
<i>Selbstwirksamkeit</i>					
Niedrig ^a	24,4 (20,1–29,2)	34,6 (30,7–38,7)	30,7 (27,7–33,9)	–	–
Moderat	13,0 (10,7–15,6)	17,8 (15,5–20,4)	15,9 (14,1–17,8)	0,4 (0,4–0,5)	<0,01
Hoch	11,2 (7,6–16,1)	15,4 (11,5–20,5)	13,5 (10,5–17,2)	0,4 (0,3–0,5)	<0,01
<i>Emotionale Probleme</i>					
Unauffällig ^a	12,8 (11,0–15,0)	19,3 (17,5–21,2)	16,7 (15,4–18,1)	–	–
Grenzwertig	30,6 (21,8–41,2)	35,3 (26,7–45,0)	33,2 (26,6–40,5)	3,9 (2,9–5,3)	<0,01
Auffällig	28,5 (20,9–37,7)	45,6 (38,3–53,1)	38,4 (33,0–44,1)	5,7 (4,4–7,4)	<0,01
<i>Familiärer Zusammenhalt</i>					
Niedrig ^a	27,7 (23,0–32,9)	32,6 (28,6–36,8)	31,0 (27,8–34,5)	–	–
Moderat	13,5 (11,6–15,6)	19,0 (16,8–21,3)	16,6 (15,2–18,2)	0,4 (0,4–0,5)	<0,01
Hoch	7,1 (4,3–11,4)	11,4 (6,4–19,7)	9,1 (5,8–14,1)	0,2 (0,1–0,3)	<0,01
Gesamt	15,8 (14,0–17,7)	22,3 (20,7–24,6)	19,8 (18,5–21,3)	–	–

^aReferenzkategorie

95 %-KI 95 %-Konfidenzintervall, UOR unadjustierte Odds Ratios

Signifikante Unterschiede mit $p < 0,01$ sind fett gedruckt