

26. Siegal D, Yudin J, Kaatz S et al (2012) Periprocedural heparin bridging in patients receiving vitamin K antagonists: systematic review and meta-analysis of bleeding and thromboembolic rates. *Circulation* 126:1630-1639
27. Spannagl M, Bauersachs R, Debus ES et al (2012) Dabigatran therapy – perioperative management and interpretation of coagulation tests. *Hamostaseologie* 32:294–305
28. Spyropoulos AC, Douketis JD, Gerotziafas G et al (2012) Periprocedural antithrombotic and bridging therapy: recommendations for standardized reporting in patients with arterial indications for chronic oral anticoagulant therapy. *J Thromb Haemost* 10:692–694
29. Spyropoulos AC, Turpie AG, Dunn AS et al (2006) Clinical outcomes with unfractionated heparin or low-molecular-weight heparin as bridging therapy in patients on long-term oral anticoagulants: the REGIMEN registry. *J Thromb Haemost* 4:1246–1252
30. Van Ryn J, Stangier J, Haertter S et al (2010) Dabigatran etexilate—a novel, reversible, oral direct thrombin inhibitor: interpretation of coagulation assays and reversal of anticoagulant activity. *Thromb Haemost* 103:1116–1127
31. Wanek MR, Horn ET, Elapavaluru S et al (2012) Safe use of hemodialysis for dabigatran removal before cardiac surgery. *Ann Pharmacother* 46:e21

Chirurg 2014 · 85:519
 DOI 10.1007/s00104-014-2785-z
 Online publiziert: 21. Mai 2014
 © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

E. Kruse · L. Leifeld
 Medizinische Klinik III, St. Bernward Krankenhaus Hildesheim

Erratum zu: Prophylaxe und konservative Therapie der Divertikelkrankheit

Versehentlich wurde in diesem Beitrag an zwei Stellen von einem rechtsseitigen, anstelle eines linksseitigen Bauchschmerzes berichtet.

Nachfolgend sind die Textpassagen korrekt wiedergegeben:

[...]In einer deutschen multizentrischen Studie wurde die Wirksamkeit von Mesalazin bei unkomplizierter Divertikelkrankheit untersucht. Insgesamt 117 Patienten mit *linksseitigen* Unterbauchschmerzen mit Nachweis von mindestens 4 Divertikeln im Kolon ohne Fieber oder Hinweis auf Komplikationen (Blutung, Fistel, Abszess, Stenose oder Peritonitis) oder auf eine bekannte CED wurden randomisiert. Die Patienten erhielten entweder 3-mal 1000 mg Mesalazin-Granulat (56 Patienten) oder Placebo (61 Patienten). Patienten in der Mesalazin-Gruppe hatten signifikant weni-

ger Schmerzen als in der Placebogruppe. [...]

[...] Bei der unkomplizierten Form der Divertikulitis (vormals Hansen und Stock I, nach der neuen Leitlinien Klassifikation Typ 1a: typische Klinik [mit *linksseitigen* Unterbauchschmerzen ohne Hinweis auf eine Abszedierung oder eine Perforation in einem bildgebenden Verfahren]) kann eine überwachende Behandlung mit Flüssigkeitsgabe ohne eine spezifische Therapie ausreichend sein. [...]

Korrespondenzadresse

Dr. E. Kruse
 Medizinische Klinik III,
 St. Bernward Krankenhaus Hildesheim,
 Treibestr. 9, 31134 Hildesheim
 dr.e.kruse@bernward-khs.de



Komentieren Sie diesen Beitrag auf springermedizin.de

► Geben Sie hierzu den Beitragstitel in die Suche ein und nutzen Sie anschließend die Kommentarfunktion am Beitragsende.

Die Online-Version des Originalartikels können Sie unter <http://dx.doi.org/10.1007/s00104-013-2619-4> finden.