

Chirurg 2015 · 86:1081
DOI 10.1007/s00104-015-0103-z
Online publiziert: 30. Oktober 2015
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015



M. Tachezy · I. Anusic · S. Rothenhöfer · F. Gebauer · J.R. Izbicki · M. Bockhorn
Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie,
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Deutschland

Erratum zu: Perioperative CRP-Bestimmung bei der Appendektomie

Klinischer Nutzen oder Geldverschwendung?

Erratum zu:

Der Chirurg (2015) 86:881–888
DOI 10.1007/s00104-014-2913-9

In dem oben genannten Artikel ist leider mehrfach eine falsche Einheit für das C-reaktive Protein (CRP) angegeben worden. Die korrekte Einheit ist mg/l. Die Autoren bitten, dieses Versehen zu entschuldigen.

Korrespondenzadresse

PD Dr. M. Tachezy
Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral- und
Thoraxchirurgie,
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Martinistr. 52, 20246 Hamburg
mtachezy@uke.uni-hamburg.de

Die Onlineversion des Originalbeitrages ist
erreichbar unter doi: [10.1007/s00104-014-2913-9](https://doi.org/10.1007/s00104-014-2913-9)