Schlusswort

Wir danken dem Kollegen T. Nishikawa für seinen differenzialdiagnostischen Hinweis einer Prurigo pigmentosa (PP). Diese vorwiegend in Japan auftretende und dort auch überwiegend beschriebene seltene Dermatose [1] weist in der Tat einige Gemeinsamkeiten mit der Papillomatosis confluens et reticularis [2] Gougerot-Carteaud (PCR) auf. So z. B. den typischen Krankheitsbeginn im jungen Erwachsenenalter, ein Überwiegen des weiblichen Geschlechts sowie einen bevorzugten Befall am Stamm [3, 4]. Während jedoch bei der Prurigo pigmentosa die Prädispositionsstellen Hals, Nacken, Dekolleté und der Schultergürtel sind [1, 3], tritt die PCR bevorzugt in den seborrhoischen Arealen intermamär und interscapulär auf. Der bei der PP beschriebene starke Juckreiz ist für die PCR untypisch. Unsere Patientin hatte lediglich einen leichten episodischen Juckreiz, der am ehesten durch die kumulativ-toxische Wirkung des 4-mal täglichen Duschbades erklär-

lich ist. Gänzlich fehlen bei der Patientin in unserer Kasuistik die für eine PP namensgebende Pigmentierung als Pigmentinkontinenz in der feingeweblichen Untersuchung und als retikuläre Hyperpigmentierung nach Abheilung der Hautveränderungen, welche bei der PP trotz klinischer Besserung und Abheilung oftmals weiterbesteht [1, 3, 4]. Eine Papillomatose in der histopathologischen Begutachtung, wie in unserem Falle der PCR beobachtet, ist, wie auch der Kollege Nishikawa richtig anmerkt, für die PP untypisch. Bei unserer Patientin (Abstammung Naher Osten) waren bereits zwei Wochen nach einwöchiger Azithromycintherapie alle Hyperpigmentierungen (vgl. Abb. 1b aus [2]) vollständig abgeheilt. Die Patientin ist seither über einen Zeitraum von mittlerweile 19 Monaten erscheinungsfrei geblieben. Die für die PP pathogenetisch diskutierten Faktoren Diabetes mellitus und Mangelernährung fehlen bei unserer Patientin ebenso [3].

Literatur

1. Nagashima M (1978) Prurigo pigmentosa: clinical observation of our 14 cases. *J Dermatol (Tokyo)* 5:61–67
2. Weigl LB, Beham A, Schnopp C, Möhrenschrager M, Abeck D (2001) Papillomatosis confluens et reticularis – Erfolgreiche Therapie mit Azithromycin. *Hautarzt* 52:947–949
3. Aramaki J, Happle R (2001) Prurigo pigmentosa. *Hautarzt* 52:111–115
4. Rabenhorst S, Dreier B, Metze D, Hildebrand A, Frosch PJ (1997) Prurigo pigmentosa. *Hautarzt* 48:406–409

Dr. Lorenz B. Weigl

Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie – am Biederstein – der Technischen Universität München, Biedersteiner Straße 29, 80802 München
E-Mail: l.weigl@lrz.tum.de

Erratum

Der Hautarzt 3/02

Im Beitrag „Otto Braun-Falco Alumni-Vorlesung“ von J. Ring (Der Hautarzt (2002) 53:226) haben sich in die Liste der Organisatoren und Redner der bisherigen Otto Braun-Falco Alumni-Vorlesungen kleine Fehlerteufel eingeschlichen. Der letzte Abschnitt lautet wie folgt:

Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in Tübingen (Organisation Prof. Rassner, Redner Prof. K. Wolff), in Heidelberg (Organisation Prof. Petzoldt, Redner Prof. Orfanos), Kiel (Organisation Prof. Christophers, Redner Prof. Goos), Lübeck (Organisation Prof. H. Wolff, Redner Prof. E. Schöpf) und in Szentendre (Ungarn) (Organisation Prof. Marghescu, Rednerin Prof. Neumann) war auch die sechste Otto

Braun-Falco Alumni-Vorlesung wieder ein herausragendes Ereignis, das im Rahmen des hervorragend organisierten und hochklassig besetzten Weltkongresses (World Congress of Skin Cancer) einen besonderen Akzent setzte.