

- of body dysmorphic concerns in Germany is increasing: data from two representative samples from 2002 and 2013. *Acta Derm Venereol* 96(217):83–90
49. Phillips KA, Grant JE, Siniscalchi JM, Stout RL, Price LH (2005) A retrospective follow-up study of body dysmorphic disorder. *Compr Psychiatry* 46:315–321
50. Stangier U, Janich C, Adam-Schwebe S et al (2003) Screening for body dysmorphic disorder in dermatological outpatients. *Dermatol Psychosom* 4:66–71
51. Stangier U, Hungerbühler R, Meyer A, Wolter M (2000) Diagnostische Erfassung der Körperdysmorphen Störung: Eine Pilotstudie. *Nervenarzt* 71:876–884
52. Phillips KA, Hollander E, Rasmussen SA et al (1997) A severity rating scale for body dysmorphic disorder: development, reliability and validity of a modified version of the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. *Psychopharmacol Bull* 33:17–22
53. Buhlmann U, Wilhelm S, Glaesmer H, Braehler E, Rief W (2009) Fragebogen körperdysmorpher Symptome (FKS): Ein Screening-Instrument. *Verhaltenstherapie* 19:237–242

Hautarzt 2017 · 68:979

<https://doi.org/10.1007/s00105-017-4080-7>

Online publiziert: 8. November 2017

© Springer Medizin Verlag GmbH 2017. Dieser Artikel ist eine Open-Access-Publikation.



CrossMark

H. Ott

Fachbereich Pädiatrische Dermatologie und Allergologie, Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT, Hannover, Deutschland

Correction: Chronische Urtikaria im Kindesalter

Rationale Diagnostik und Therapie

Correction:

Hautarzt 2017

<https://doi.org/10.1007/s00105-017-3985-5>

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

im oben genannten Beitrag ist auf S. 8, im 2. Absatz unter der Zwischenüberschrift Omalizumab, leider ein Fehler unterlaufen. Der Satz sollte lauten: „Omalizumab wird unabhängig von Körpergewicht oder Serum-IgE-Spiegel 4-wöchentlich zusätzlich zur nsH1-AH-Gabe in einer Dosierung von 300 mg vornehmlich subkutan im Bereich des *M. deltoideus* injiziert.“ Wir bitten Sie, die richtige Version zu berücksichtigen und den Fehler zu entschuldigen.

Korrespondenzadresse

PD Dr. H. Ott

Fachbereich Pädiatrische Dermatologie und Allergologie, Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT
Janusz-Korczak-Allee 12, 30173 Hannover, Deutschland
ott@hka.de

Die Online-Version des Originalartikels ist unter <https://doi.org/10.1007/s00105-017-3985-5> zu finden.