

# Häufigste Dermatosen der Mamillenhaut

Johannes Wohlrab



## Irritatives Kontaktekzem

Sport (joggers nipple), ungeeignete Leibwäsche bzw. Hautpflege, Sexpraktiken

## Mastitis

## Candidose

häufig auch intertriginös, orointestinale Candidose

## Allergisches Kontaktekzem

Kontakt mit Allergenen über Wäsche, Topika, Piercings, Kindernahrung

## Atopisches Ekzem

häufig auch trockene Haut am Stamm, beugeassoziierte Ekzemerde an den Extremitäten, Anamnese

## Scabies


bestialischer Juckreiz insbesondere bei Wärme, Kratzeffekte

## Impetiginisation

häufig Staphylokokken, Übergang in Mastitis möglich

## Mammärer M. Paget

Duktales Carcinoma in situ vs. M. Paget der Mamille vom extramammären Typ



## Was bei der Topikatherapie beachten?

- Besondere Penetrationsbedingungen der Mamillenhaut
- ↑ Risiko für unerwünschte Wirkungen v.a. bei Behandlung mit Arzneistoffen (z.B. Glukokortikoide)
- Spezielle präventive Pflge-therapeutika bei Atopiker\*innen, Mammakarzinom usw.
- Bei Infektionen: Polihexanid oder Octenidindihydrochlorid als Antiseptika in halbfesten Formulierungen

Lesen Sie mehr: .....  
Luu Thi TH, Eichner A, Wohlrab J (2022) Therapeutische Besonderheiten bei Erkrankungen der Mamillenhaut, [www.springermedizin.de/link/10.1007/s00105-022-05031-3](http://www.springermedizin.de/link/10.1007/s00105-022-05031-3)

Abb. gezeichnet mit OmniGraffle Pro V7.20, Omni Development Inc., Seattle, USA

