HNO 2021 · 69:156

<https://doi.org/10.1007/s00106-020-00987-x>

Online publiziert: 13. Januar 2021

© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2021

Florian Simon

Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, LMU Klinikum, München, Deutschland

Erratum zu: Diagnostik und Behandlung der Otitis externa

Erratum zu:

HNO 2020

<https://doi.org/10.1007/s00106-020-00952-8>

Hinweis: Teile dieses Beitrags wurden bereits in der Zeitschrift *MMW Fortschritte der Medizin* (2019) 161:35–39 erstpubliziert.

Ergänzung auf S. 883 im Abschnitt „Therapie der akuten diffusen Otitis externa“: Für die Salbenstreifeneinlage steht neben der Wirkstoffkombination Fluocinolonacetonid und Neomycin im „Off-Label-Use“ ebenso die Kombination aus Polymyxin-B-Sulfat, Bacitracin und Hydrocortisonacetat als zugelassene Alternative für die Indikation der Otitis externa diffusa zur Verfügung.

Wir bitten, den Hinweis und die Ergänzung zu beachten.

Korrespondenzadresse

Dr. med. Florian Simon

Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, LMU Klinikum
Marchioninistr. 15, 81377 München,
Deutschland
florian.simon@med.uni-muenchen.de

Die Online-Version des Originalartikels ist unter <https://doi.org/10.1007/s00106-020-00952-8> zu finden.