

Internist 2011 · 52:478–478
 DOI 10.1007/s00108-010-2790-3
 Online publiziert: 6. März 2011
 © Springer-Verlag 2011

Z. Wolf · H. Mani · E. Lindhoff-Last
 Medizinische Klinik III, Schwerpunkt Angiologie und
 Hämostaseologie, Zentrum der Inneren Medizin, Klinikum der
 Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main

Erratum zu: Stellenwert der Thrombozytenfunk- tionsdiagnostik

Die **Abb. 1** wurde mit einer falschen Beschriftung innerhalb der Abbildung eingereicht und der Fehler ist erst jetzt aufgefallen. Anbei finden Sie die richtige Abbildung. In der gedruckten Abbildung steht an einer Stelle statt „der primären und sekundären Hämostase“ lediglich „der sekundären Hämostase“. Dies ist inhaltlich falsch.

Korrespondenzadresse

Dr. Z. Wolf
 Medizinische Klinik III, Schwerpunkt
 Angiologie und Hämostaseologie, Zentrum der
 Inneren Medizin, Klinikum der Johann Wolfgang
 Goethe-Universität
 Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main
 Zsuzsanna.Wolf@kgu.de




Abb. 1 ▲ Schematische Darstellung der primären und sekundären Hämostase

Originalartikel

Internist 51 (9):1095-1108,
 DOI 10.1007/s00108-009-2569-6
 Den Beitrag finden Sie online unter
<http://dx.doi.org/10.1007/s00108-009-2569-6>.