



**H. Ott**

Fachbereich Pädiatrische Dermatologie und Allergologie, Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT,  
Hannover, Deutschland

# Correction: Chronische Urtikaria im Kindesalter. Rationale Diagnostik und Therapie

## Correction:

Monatsschr Kinderheilkd 2017

<https://doi.org/10.1007/s00112-017-0273-5>

Im oben genannten Beitrag ist leider ein Fehler unterlaufen. Auf S. 444 steht im 2. Absatz unter der Zwischenüberschrift Omalizumab:

„Omalizumab wird unabhängig von Körpergewicht oder Serum-IgE-Spiegel 4-wöchentlich zusätzlich zur nsH1-AH-Gabe in einer Dosierung von 300 mg vornehmlich in den M. deltoideus injiziert.“

Der Satz sollte lauten:

„Omalizumab wird unabhängig von Körpergewicht oder Serum-IgE-Spiegel 4-wöchentlich zusätzlich zur nsH1-AH-Gabe in einer Dosierung von 300 mg vornehmlich subkutan im Bereich des M. deltoideus injiziert.“

Wir bitten Sie, die korrekte Version zu berücksichtigen und den Fehler zu entschuldigen.

---

## Korrespondenzadresse

---

**PD Dr. H. Ott**

Fachbereich Pädiatrische Dermatologie und Allergologie, Kinder- und Jugendkrankenhaus AUF DER BULT  
Janusz-Korczak-Allee 12, 30173 Hannover, Deutschland  
ott@hka.de

---

---

Die Online-Version des Originalartikels ist unter <https://doi.org/10.1007/s00112-017-0273-5> zu finden.