Monatsschr Kinderheilkd 2019 · 167:1009
<https://doi.org/10.1007/s00112-019-00790-1>
Online publiziert: 30. September 2019
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2019

M. Lehner¹ · S. Deininger² · D. Wendling-Keim³

¹ Kinderchirurgische Klinik, Kinderspital Luzern, Luzerner Kantonsspital, Luzern, Schweiz

² Sektion Kinderneurochirurgie, Neurochirurgische Klinik, Universität Ulm, Ulm, Deutschland

³ Kinderchirurgische Klinik, Dr. von Hauner'sches Kinderspital, Ludwig-Maximilians-Universität, München, Deutschland

Erratum zu: Management des Schädel-Hirn-Traumas im Kindesalter

Erratum zu:

Monatsschr Kinderheilkd 2019

<https://doi.org/10.1007/s00112-019-00770-5>

Die Online-Version des Artikels enthielt zunächst fehlerhafte Angaben zur Herstellung der 3 % NaCl-Lösung.

Der Text lautete:

„Hierzu sind aus einer 500 ml Flasche NaCl 9,0 % 47 ml zu verwerfen und mit 47 ml NaCl 23,4 %iger Lösung zu ersetzen.“

Korrekt ist:

„Hierzu sind aus einer 500 ml Flasche NaCl **0,9 %** 47 ml zu verwerfen und mit 47 ml NaCl 23,4 %iger Lösung zu ersetzen.“

Außerdem wurde unter Risikofaktoren für eine relevante Gehirnverletzung fälschlich das Kalottenhämatom bei Kindern im Alter unter 2 Jahren genannt. Korrekt ist, dass bei Kindern im Alter unter 2 Jahren das **Kopfschwartenhämatom** ein Risikofaktor für das Vorliegen einer klinisch relevanten Hirnverletzung ist.

Beide Angaben wurden korrigiert. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Korrespondenzadresse

Dr. M. Lehner

Kinderchirurgische Klinik, Kinderspital Luzern,
Luzerner Kantonsspital
Spitalstr. 20, 6000 Luzern, Schweiz
Markus.Lehner@luks.ch

Die Online-Version des Originalartikels ist unter
<https://doi.org/10.1007/s00112-019-00770-5>
zu finden.