Monatsschr Kinderheilkd 2021 · 169:272–274
<https://doi.org/10.1007/s00112-021-01123-x>
 Online publiziert: 18. Februar 2021
 © Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
 Springer Nature 2021

Ernährungskommission der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) · Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) · Ernährungskommission der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie (SGP) · Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) · Nadja Haiden¹

¹ Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie, Medizinische Universität Wien, Wien, Österreich

Erratum zu: Parenterale Ernährung von Früh-, Neugeborenen, Kindern und Jugendlichen

Konsensuspapier, basierend auf den Leitlinien der ESPGHAN, ESPEN, ESPR und CSPEN

Erratum zu:

Monatsschr Kinderheilkd 2020

<https://doi.org/10.1007/s00112-020-00881-4>

In **Tab. 4** (Zusammensetzung von für pädiatrische Patienten zugelassenen i. v.-Lipidlösungen) kam es zu Übertragungsfehlern für die α -Tocopherolwerte bei den Fettemulsionen Sojabohnenöl/MCT-Öl und Sojabohnenöl/MCT-Öl/Fischöl. In den **Tab. 6** (Empfohlene mittlere Zufuhr der einzelnen Vitamine bei Früh- und Neugeborenen) und **Tab. 15** (Empfohlene mittlere Tageszufuhr von Vitaminen in Abhängigkeit

vom Lebensalter) sind die Einheiten für Vitamin B1 und Vitamin K nicht korrekt: Bei der empfohlenen Zufuhr für Vitamin B1 handelt es sich um Dosen im μ g-Bereich und nicht, wie in den Tabellen angegeben, um mg. Bei Vitamin K handelt es sich ebenfalls um Dosen im μ g-Bereich und nicht, wie angegeben, um I.E.

In **Tab. 15** ist zusätzlich die Einheit für Vitamin A nicht korrekt angegeben. Bei der empfohlenen Zufuhr handelt es sich um Dosen im μ g-Bereich und nicht, wie in der Tabelle angegeben, um I.E.

Des Weiteren sind in **Tab. 16** (Empfohlene mittlere Zufuhr von Spurenele-

Tab. 4 Zusammensetzung von für pädiatrische Patienten zugelassenen i. v.-Lipid-Lösungen [1]

Inhaltsstoff	Sojabohnenöl	Sojabohnenöl/MCT-Öl	Sojabohnenöl/Olivenöl	Sojabohnenöl/Olivenöl/MCT-Öl/Fischöl	Sojabohnenöl/MCT-Öl/Fischöl
Sojaöl (Anteil, %)	100	50	20	30	50
Olivenöl (Anteil, %)	0	0	80	25	0
MCT (Kokosnuss, Anteil, %)	0	50	0	30	40
Fischöl (Anteil, %)	0	0	0	15	10
α -Tocopherol (mg/l)	21	132	32	164,5	177
Phytosterole (mg/l)	423,1	268,5	266,1	170,6	k. A.

MCT „medium-chain triglycerides“ (mittelkettige Triglyzeride)

Die Online-Version des Originalartikels ist unter <https://doi.org/10.1007/s00112-020-00881-4> zu finden.

Tab. 6 Empfohlene mittlere Zufuhr der einzelnen Vitamine bei Früh- und Neugeborenen [2]

Vitamin	Empfohlene Zufuhr pro kgKG und Tag	
	Frühgeborene	Reifgeborene
Vitamin A (I.E.)	700–1500	500–1000 od. 2300/d
Vitamin D (I.E.)	80–400	40–150
Vitamin E (I.E.)	2,8–3,5	2,8–3,5
Vitamin K (μg)	10	10
Vitamin C (mg)	15–25	15–25
Vitamin B ₁ (μg)	350–500	350–500
Vitamin B ₂ (μg)	150–200	150–200
Nikotinamid/Niacin (mg)	4–6,8	4–6,8
Vitamin B ₆ (μg)	150–200	150–200
Panthotensäure (mg)	2,5	2,5
Biotin (μg)	5–8	5–8
Folsäure (μg)	56	56
Vitamin B ₁₂ (μg)	0,3	0,3

Tab. 15 Empfohlene mittlere Tageszufuhr von Vitaminen in Abhängigkeit vom Lebensalter [2]

Vitamin	Empfohlene Zufuhr pro kgKG und Tag	
	Säuglinge bis 12 Monate	Kinder und Jugendliche
Vitamin A (μg)	150–300	150
Vitamin D (I.E.)	40–150	400–600
Vitamin E (I.E.)	2,8–3,5	11
Vitamin K (μg)	10	200
Vitamin C (mg)	15–25	80
Vitamin B ₁ (μg)	350–500	1200
Vitamin B ₂ (μg)	150–200	1400
Nikotinamid/Niacin (mg)	4–6,8	17
Vitamin B ₆ (μg)	150–200	1000
Panthotensäure (mg)	2,5	5
Biotin (μg)	5–8	20
Folsäure (μg)	56	140
Vitamin B ₁₂ (μg)	0,3	1

Tab. 16 Empfohlene mittlere Zufuhr an Spurenelementen [3]

Spurenelement	Empfohlene Zufuhr pro kg KG und Tag			Empfohlene Zufuhr pro Tag
	0–3 Monate	3–12 Monate	1–18 Jahre	Maximum
Zink	250 μg	100 μg	50 μg	5 mg
Kupfer	20 μg	20 μg	20 μg	0,5 mg
Selen	2–3 μg	2–3 μg	2–3 μg	100 μg
Chrom	–	–	–	5 μg
Mangan	$\leq 1 \mu\text{g}$	$\leq 1 \mu\text{g}$	$\leq 1 \mu\text{g}$	50 μg
Molybdän	0,25 μg	0,25 μg	0,25 μg	5 μg
Iod	1 μg	1 μg	1 μg	–
Eisen	50–100 μg	50–100 μg	50–100 μg	5 mg

menten) die Überschriften der Altersgruppen verrutscht. Irrtümlich wurde die Altersgruppe 3–12 Monate zweimal angegeben statt 3–12 Monate, 1–18 Jahre und Maximum. Dies wurde korrigiert.

Anbei die korrekten Tabellen mit entsprechenden Werten.

Wir bitten die Fehler zu entschuldigen und die korrekten Angaben zu berücksichtigen.

Korrespondenzadresse

Assoz. Prof. PD Dr. Nadja Haiden, MSc.

Universitätsklinik für Klinische Pharmakologie,
Medizinische Universität Wien
Währinger Gürtel 18–20, 1090 Wien, Österreich
nadja.haiden@meduniwien.ac.at

Literatur

1. Cai W et al (2018) Biological and Clinical Aspects of an Olive Oil-Based Lipid Emulsion-A Review. *Nutrients*. 10(6):776. <https://doi.org/10.3390/nu10060776>
2. Bronsky J, Campoy C, Braegger C, nutrition EEEcwgopp (2018) ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Vitamins. *Clin Nutr* 37(6 Pt B):2366–2378. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.06.951>
3. Domellöf M, Szitanyi P, Simchowicz V, Franz A, Mimouni F, nutrition EEEcwgopp (2018) ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Iron and trace minerals. *Clin Nutr* 37(6 Pt B):2354–2359. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.06.949>

Hier steht eine Anzeige.