Erratum zu: Fieber bei pädiatrischen Reiserückkehrern

Rebecca L. Knoll¹ · Martin S. Dennebaum²

¹ Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsmedizin, Mainz, Deutschland

² Institut für Mikrobiologie und Hygiene, Abteilung Infektionsmedizin, Universitätsmedizin, Mainz, Deutschland

Erratum zu:
Monatsschr Kinderheilkd 2021 · 169:
426–431
<https://doi.org/10.1007/s00112-021-01147-3>

Im Artikel sind die im Text erwähnten Inkubationszeiten der Malaria in Tab. 1 nicht vollständig dargestellt. Die vervollständigte Übersicht über Reiseregionen und Inkubationszeiten ist der hier gezeigten **Tab. 1** zu entnehmen (**Tab. 1**).

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und die korrekten Angaben zu berücksichtigen.

Korrespondenzadresse

Dr. Martin S. Dennebaum
 Institut für Mikrobiologie und Hygiene, Abteilung Infektionsmedizin, Universitätsmedizin Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz, Deutschland
Martin.Dennebaum@unimedizin-mainz.de

Tab. 1 Reiseregion und Inkubationszeit für wichtige fieberhafte tropentypische Erkrankungen bei Reiserückkehrern					
Inkubationszeit	Mittelmeerraum	Süd- und Südostasien	Subsahara-Afrika	Karibik/Zentralamerika	Südamerika
< 14 Tage	Zeckenstichfieber , Chikungunya-, Dengue-, West-Nil-Fieber, Leptospirose, Typhus, hämorrhagisches Krim-Kongo-Fieber	Malaria, Dengue-Fieber , Typhus, Chikungunya-fieber , Tsutsugamushi-Fieber, Leptospirose	Malaria (überwiegend <i>Plasmodium falciparum</i>), Zeckenstichfieber (Hauptfieberursache aus Südafrika), Dengue -, Chikungunyafieber, Typhus, Meningokokkenmeningitis, Rückfallfieber (Ostafrika)	Chikungunya -, Dengue-Fieber , Malaria (Hispaniola, überwiegend <i>Plasmodium falciparum</i>), Zika-Fieber , Typhus, Leptospirose, akute Histoplasmose	Malaria , Chikungunya -, Dengue -, Zika-Fieber , Leptospirose, Typhus, akute Histoplasmose
14 Tage bis 6 Wochen	Brucellose, akute Schistosomiasis (Korsika)	(Non-falciparum-) Malaria , Melioidose	Malaria (überwiegend <i>Plasmodium falciparum</i>), akute Schistosomiasis (Katayama-Fieber), afrikanische Trypanosomiasis	Malaria , Kokzidioidomykose	Malaria , Oroya-Fieber
> 6 Wochen	Brucellose, akute Schistosomiasis (Korsika), Leishmaniose (viszeral)	(Non-falciparum-) Malaria , Leishmaniose (viszeral), Melioidose	Malaria , akute Schistosomiasis (Katayama-Fieber)	Malaria	Malaria , Leishmaniose (viszeral)

Häufige Erkrankungen sind **fett** gedruckt. Da die Inkubationszeiten variieren, kommen Mehrfachnennungen vor bzw. es wurde die Inkubationszeit angegeben, in der sich die Mehrzahl der Erkrankungen manifestieren

Die Online-Version des Originalartikels ist unter <https://doi.org/10.1007/s00112-021-01147-3> zu finden.

QR-Code scannen & Beitrag online lesen