Unfallchirurg 2018 · 121:510
<https://doi.org/10.1007/s00113-018-0497-4>
 Online publiziert: 12. April 2018
 © Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
 Springer Nature 2018

T. Jaehn¹ · R. Sievers¹ · A. Wanninger² · J. Kaiser³ · A. Kaiser³ · B. Reichert¹

¹ Universitätsklinik für Plastische, Wiederherstellende und Handchirurgie, Zentrum für
 Schwerbrandverletzte, Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Klinikum Nürnberg Süd, Nürnberg,
 Deutschland

² Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Klinikum St. Marien, Amberg, Deutschland

³ Institut für Pathologie, Universitätsinstitut der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Nürnberg,
 Klinikum Nürnberg, Nürnberg, Deutschland

Erratum zu: Osteoidosteom im Os scaphoideum als Ursache für radiokarpale Handgelenksbeschwerden bei einem 15-jährigen Patienten

Erratum zu:

Unfallchirurg 2018

<https://doi.org/10.1007/s00113-018-0479-6>

In der zunächst veröffentlichten Online-Version des Beitrags waren die möglichen Differenzialdiagnosen zum Osteoidosteom im Os scaphoideum (■ **Tab. 1**) nicht richtig wiedergegeben. Wir bitten, die korrekte Tabelle zu beachten, und entschuldigen uns für den Fehler.

Korrespondenzadresse

Dr. T. Jaehn

Universitätsklinik für Plastische, Wiederherstellende und Handchirurgie, Zentrum für Schwerbrandverletzte, Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Klinikum Nürnberg Süd
 Breslauer Straße 201, 90471 Nürnberg, Deutschland
tobias.jaehn@klinikum-nuernberg.de

Literatur

18. Hoffmann R (2009) Checkliste Handchirurgie, 3. Aufl. Thieme, Stuttgart

Tab. 1 Mögliche Differenzialdiagnosen zum Osteoidosteom im Os scaphoideum (Mod. nach Hoffmann [1])

Differenzialdiagnose	Radiologischer Befund
Intraossäre Epithelzyste	Kreisrunde, wie ausgestanzt wirkende Zyste, dadurch vom <i>Enchondrom</i> zu differenzieren
Enchondrom	Typisch wabige, osteolytische Struktur mit kleinen Verkalkungen <i>Kortikalis immer intakt</i>
Aneurysmatische Knochenzyste	Blasige Auftreibung, dünne erhaltene Kortikalis, <i>keine Kalzifizierung</i>
Osteogenes Sarkom	Destruktion des Knochens
Scaphoidzyste	Umschriebene Defekte
Intraossäres Ganglion	Umschriebene Defekte, <i>Kortikalisarrosion</i>
Fraktur des Os scaphoideum	Vorkommen selten, frische Fraktur, nicht mit Nekrose zu verwechseln, Abgrenzung jedoch erschwert bei degenerativen Veränderungen
<i>Osteoidosteom</i>	Wenige Millimeter großer <i>Nidus</i> , <i>nahe oder in verdickter Kortikalis gelegen</i> , umgeben von Aufhellungsrand, Umgebung kann vermehrt <i>sklerosiert</i> sein

Die Online-Version des Originalartikels ist unter
<https://doi.org/10.1007/s00113-018-0479-6> zu
 finden.