

Nervenarzt 2004 · 75:932  
 DOI 10.1007/s00115-004-1784-6  
 © Springer-Verlag 2004

T. Reker<sup>1</sup> · D. Richter<sup>1</sup> · B. Bätz<sup>2</sup> · U. Luedtke<sup>3</sup> · H. D. Koritsch<sup>4</sup> · G. Reyman<sup>5</sup>

- <sup>1</sup>Westfälische Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Münster
- <sup>2</sup>Westfälische Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Warstein
- <sup>3</sup>Westfälische Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie Lengerich
- <sup>4</sup>Hans-Prinzhorn-Klinik Hemer
- <sup>5</sup>Westfälisches Zentrum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Dortmund

# Kurzfristige Effekte der stationären Akutbehandlung alkoholabhängiger Patienten

Eine prospektive, multizentrische Evaluationsstudie

Nervenarzt (2004) 75:234–241

In dem Beitrag „Kurzfristige Effekte der stationären Akutbehandlung alkoholabhängiger Patienten. Eine prospektive, multizentrische Evaluationsstudie“ von T. Reker et al. ist die **■ Tabelle 4** nicht korrekt erschienen.

Die korrekte **■ Tabelle 4** lautet:

## Korrespondierender Autor

**Dr. T. Reker**

Westfälische Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Münster,  
 Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße 30, 48147 Münster  
 E-Mail: t.reker@wkp-muenster.de

Tabelle 4

**Prädiktoren eines ungünstigen Behandlungsergebnisses (schwerer Rückfall und/oder erneute stationäre Behandlung), logistische Regression**

| Item   | Signifikanz | Odds Ratio | 95%-Konfidenzintervall |
|--|-------------|------------|------------------------|
| Zwei und mehr Entzüge in den letzten 6 Monaten | 0,015       | 2,05       | 1,14–3,65              |
| Promille Atemalkohol bei Aufnahme              | 0,038       | 1,26       | 1,01–1,59              |
| Socrates Action Taking Aufnahme                |             |            |                        |
| • niedrig (bis 21)                             | 0,033       | 2,12       | 1,06–4,23              |
| • mittel (21–27)                               | 0,014       | 2,24       | 1,17–4,28              |
| • hoch (über 27)                               |             | 1          |                        |
| GAF bei Aufnahme                               | 0,03        | 0,98       | 0,96–0,99              |
| Anzahl Vertrauenspersonen post                 |             |            |                        |
| • keine  | 0,047       | 2,7        | 1,01–7,21              |
| • bis 3 Personen                               | 0,025       | 1,88       | 1,08–1,59              |
| • mehr als 3                                   |             | 1          |                        |
| Freizeit mit (post)                            |             |            |                        |
| • Freunde/Angeh. mit Alkoholproblemen          | 0,018       | 2,37       | 1,16–4,84              |
| • alleine                                      | 0,025       | 2,04       | 1,09–3,80              |
| • Freunde/Angeh. ohne Alkoholprobleme          |             | 1          |                        |
| Behandlungsdauer                               |             |            |                        |
| • bis 7 Tage                                   | 0,015       | 2,91       | 1,23–6,88              |
| • 8–11 Tage                                    | 0,195       | 1,62       | 0,78–3,39              |
| • 12–15 Tage                                   | 0,044       | 2,19       | 1,02–4,67              |
| • 16 und mehr Tage                             |             | 1          |                        |

*Adjustiert für: Alter, Geschlecht, Delir und Krampfanfälle in der Anamnese, Monatseinkommen, komorbide psychische Störungen, Entzugsmedikation, Arbeitslosen- bzw. Sozialhilfebezug im Katamnesezeitraum, Teilnahme an Selbsthilfegruppen im Katamnesezeitraum, Antritt einer Reha-Maßnahme. GAF Global Assessment of Functioning Scale*

Die Online-Version des Originalartikels können Sie unter <http://dx.doi.org/10.1007/s00115-003-1496-3> finden.