Urologe 2019 · 58:1498
<https://doi.org/10.1007/s00120-019-01076-w>
 Online publiziert: 27. November 2019
 © Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019

T. Bschleipfer¹ · R. Doggweiler² · D. Schultz-Lampel³ · J. de Jong⁴ · A. Gonsior⁵ · J. Hensen⁶ · E. Heßdörfer⁷ · B. T. Kaftan⁸ · A. Kuhn⁹ · U. Kunzendorf¹⁰ · A. Lampel¹¹ · A. Landmesser¹² · A. Loch¹³ · O. Moormann¹⁴ · B. Müller¹⁵ · J. Neuhaus¹⁶ · A. Reich¹⁷ · R. Roth¹⁸ · S. Schumacher¹⁹ · R. Stratmeyer²⁰ · W. Vahlensieck²¹ · A. Wördehoff²² · B. Munder-Hensen²³

¹ Klinik für Urologie, Andrologie und Kinderurologie, Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum, Zentrum für Interstitielle Cystitis und Beckenschmerz, Klinikum Weiden/Kliniken Nordoberpfalz AG, Weiden i.d.OPf., Deutschland; ² Kontinenzzentrum Hirslanden, Zürich, Schweiz; ³ Kontinenzzentrum Süd-West, Schwarzwald-Baar-Klinikum, Villingen-Schwenningen, Deutschland; ⁴ Physio Artos, Interlaken, Schweiz; ⁵ Klinik für Urologie, Universität Leipzig AöR, Leipzig, Deutschland; ⁶ MICA Multinational Interstitial Cystitis Association, Euskirchen, Deutschland; ⁷ Blasenzentrum Westend, Urologische Privatzpraxis, Berlin, Deutschland; ⁸ Städtisches Klinikum Lüneburg, Lüneburg, Deutschland; ⁹ Zentrum für Urogynäkologie, Frauenklinik, Inselspital Bern, Bern, Schweiz; ¹⁰ Klinik für Innere Medizin IV, Univers. Klinikum Schleswig-Holstein, Universität Kiel, Kiel, Deutschland; ¹¹ Klinik für Urologie und Kinderurologie, Schwarzwald-Baar-Klinikum, Villingen-Schwenningen, Deutschland; ¹² Physiohof Landmesser, Erkelenz, Deutschland; ¹³ Urologische Praxis, Westerland, Deutschland; ¹⁴ St.-Josefs-Hospital Dortmund-Hörde, Klinik für Urologie, Katholische St. Lukas Gesellschaft, Dortmund, Deutschland; ¹⁵ Urologische Praxis, Berlin-Charlottenburg, Deutschland; ¹⁶ Forschungslabor der Klinik und Poliklinik für Urologie, Universität Leipzig AöR, Leipzig, Deutschland; ¹⁷ Klinik für Frauenheilkunde & Geburtshilfe, Donauklinik Neu-Ulm, Neu-Ulm, Deutschland; ¹⁸ Kirchheim, Deutschland; ¹⁹ Healthpoint Hospital, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate; ²⁰ Curos – Urologisches Zentrum in der Klinik Links vom Rhein, Köln-Rodenkirchen, Deutschland; ²¹ Urologische Abteilung, Kurpark-Klinik, Bad Nauheim, Deutschland; ²² ehem. Praxisklinik Wördehoff, Mechernich, Deutschland; ²³ ICA-Deutschland, Euskirchen, Deutschland

Erratum zu: Diagnostik und Therapie der interstitiellen Zystitis (IC/BPS). S2k-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Urologie

Erratum zu:
Urologe 2019
<https://doi.org/10.1007/s00120-019-01054-2>

Leider ist in der **Infobox 5** ein Fehler aufgetreten. Korrekt muss es hier „Komplementärmedizinische Therapie – Empfehlungen und Konsens“ heißen.

Wir bitten die korrekte Bezeichnung zu beachten und den Fehler zu entschuldigen.

Infobox 5 Komplementärmedizinische Therapie – Empfehlungen und Konsens

Trotz schwer interpretierbarer Studienergebnisse kann durch **Akupunktur** eine signifikante Reduktion der Scores von VAS, PUF, ICSI erreicht werden [**kann erwogen werden – 100 %**].
 Eine **Mikrobiologische Therapie** kann Funktionsstörungen der Schleimhäute und des Immunsystems regulieren [**kann erwogen werden – 85 %**].
 Laut Theorie kann eine **Neuraltherapie** Störungen beseitigen, die sich in IC-Symptomatik ausdrücken [**kann erwogen werden – 95 %**].
 Eine **Orthomolekulare Therapie** kann Mikronährstoffdefizite ausgleichen [**kann erwogen werden – 95 %**].

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. med. Dr. phil. T. Bschleipfer, F.E.B.U.

Klinik für Urologie, Andrologie und Kinderurologie, Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum, Zentrum für Interstitielle Cystitis und Beckenschmerz, Klinikum Weiden/Kliniken Nordoberpfalz AG Söllnerstraße 16, 92637 Weiden i.d.OPf., Deutschland
 thomas.bschleipfer@kliniken-nordoberpfalz.ag

Die Online-Version des Originalartikels ist unter <https://doi.org/10.1007/s00120-019-01054-2> zu finden.