

Ophthalmologie 2021 · 118 (Suppl 1):S15
<https://doi.org/10.1007/s00347-020-01296-y>
Online publiziert: 9. Dezember 2020
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2020



Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG)¹ · Berufsverband der
Augenärzte Deutschlands e. V. (BVA)²

¹ Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, München, Deutschland

² Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e. V., Düsseldorf, Deutschland

Erratum zu: *Bewertung von Risikofaktoren für das Auftreten des Offenwinkelglaukoms*

Leitlinie von DOG und BVA

Erratum zu:
Ophthalmologie 2020

<https://doi.org/10.1007/s00347-020-01169-4>

In der ursprünglichen Version der Leitlinie wurde im Text zu den Empfehlungen 4–9 und 4–12 für den Risikofaktor „grenzwertige Papillenexkavation“ versehentlich eine falsche vertikale Cup-to-disc-Ratio angegeben. Der korrigierte Wert lautet $\geq 0,6$.

Der ursprüngliche Artikel wurde korrigiert. Wir bitten die neue Version zu berücksichtigen und den Fehler zu entschuldigen.

Korrespondenzadresse

Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG)

Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft
Platenstr. 1, 80336 München, Deutschland
geschaeftsstelle@dog.org

Die Online-Version des Originalartikels ist unter
<https://doi.org/10.1007/s00347-020-01169-4>
zu finden.