Im Beitrag

G. Bornhöft, S. Maxion-Bergemann, P. F. Matthiessen „Die Rolle der externen Validität bei der Beurteilung klinischer Studien zur Demenzbehandlung mit Ginkgo-biloba-Extrakten, Z Gerontol Geriat (Online-First-Version des Beitrages unter <http://dx.doi.org/10.1007/s00391-008-0521-3>) wurden in der Online-first-Version teilweise falsche Dosierungsangaben angegeben, die wir wie folgt korrigieren möchten:

Die in der Online-First-Version auf den Seiten 2, 3, 7, 10, 13, und 14 angegebene niedrige Dosierung in der Studie Brautigam et al. 1998 [10] bezieht sich nicht auf den Ginkgogesamtextrakt, sondern nur auf die darin enthaltene Ginkgolidmenge und entspricht ca. 25–50% einer EGb 761(R)-Tagesdosis in der hoch dosierten bzw. 12–25% in der niedriger dosierten Studiengruppe. Der Gehalt an Flavonglykosiden entspricht lediglich 2–4% bzw. 1–2% der EGb 761(R)-Dosierung. Über den Bilobalidgehalt wurden keine Angaben gemacht.

Online publiziert: 6. August 2008

- Deutsche Zusammenfassung, Zeile 55
falsch ist: ... wovon 1 Studie die sonst übliche Dosierung von 120–240 mg/d mit 1,9 bzw. 0,9 mg/d deutlich unterschritt.
richtig ist: wovon 1 Studie die sonst übliche Dosierung deutlich unterschritt.
- Englisches Abstract, Zeile 51
falsch ist: One of these negative studies used only 2 mg/d ginkgo extract, which is far below the usual dose range of 120–240 mg/d.
richtig ist: One of these negative studies used daily doses far below the usual dose range.
- Tabelle 2, Spalte Dosis (mg), Erstautor Brautigam
falsch ist: 0,9; richtig ist: k.A.
falsch ist: 1,9; richtig ist: k.A.
- Tabelle 2, Spalte Bemerkungen, Erstautor Haase
falsch ist: Nur schwerwiegende Begleiterkrankungen als Ausschlussgrund
richtig ist: Nur schwerwiegende Begleiterkrankungen als Ausschlussgrund, Applikationsform Infusion (gute sog. Modellvalidität, geringe externe Validität)
- Tabelle 3, Spalte Dosis (mg), Erstautor Hofferberth
falsch ist: 80; richtig ist: 240
- Tabelle 3, Spalte Bemerkungen, Erstautor Hofferberth
falsch ist: Applikationsform Infusion (gute sog. Modellvalidität, geringe externe Validität)
richtig ist: k.A.
- Seite 10, Abschnitt Intervention, erster Satz
falsch ist: Die meisten Studien verwandten Dosierungen von 120 oder 160 mg pro Tag, 5 Studien von 240 mg/d, eine von 80 mg/d und eine nur von 0,9 bzw. 1,9 mg/d.
richtig ist: Die meisten Studien verwandten Dosierungen von 120 oder 160 mg pro Tag, 6 Studien von 240 mg/d, und eine nur von wenigen ml eines niedrig konzentrierten Extrakts
- Tabelle 3, Spalte Kommentar, fünfte Zeile von unten
falsch ist: ... , der allerdings mit einer Dosierung von <2 mg/d unter der als wirksam angesehenen Dosis blieb, ...
richtig ist: ... , der allerdings weit unter der als wirksam angesehenen Dosis blieb, ...
- Seite 14, linke Spalte, neunte Zeile von oben
falsch ist: ... die Dosierung mit <2 mg/d weit unter der wirksamen Dosis ...
richtig ist: ... die Dosierung mit <2 ml/d eines niedrig konzentrierten Extraktes weit unter der wirksamen Dosis ...

Der Verlag bittet diese Fehler zu entschuldigen!