Z Gerontol Geriat 2020 · 53:796

<https://doi.org/10.1007/s00391-020-01822-2>

Online publiziert: 25. November 2020

© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von Springer Nature 2020

Werner Hofmann^{1,2} · Kristina Flägel¹ · Markus Gosch³

¹ Institut für Allgemeinmedizin, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), Campus Lübeck, Lübeck, Deutschland

² Geriatisches Zentrum Neumünster & Bad Bramstedt, Neumünster, Deutschland

³ Universitätsklinik für Geriatrie, Medizinische Klinik 2 – Schwerpunkt Geriatrie, Klinikum Nürnberg, Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Campus Nürnberg, Nürnberg, Deutschland

Erratum zu: Hyponatriämie im Alter (II) – eine klare Therapie

Tücken erkennen und Fallstricke umgehen

Erratum zu:

Z Gerontol Geriat 2020

<https://doi.org/10.1007/s00391-020-01758-7>

58-7

Auf der letzten Seite des Beitrags befindet sich im „Fazit für die Praxis“ eine fehlerhafte Angabe.

Der korrekte Satz lautet:

„Bei schweren Symptomen (Akutbehandlung) geht der Trend der Empfehlungen zu einer (bis maximal 2-mal wiederholter) Bolusgabe von 100 ml 3 %iger NaCl-Lösung“.

Der Verlag bittet, den Fehler zu entschuldigen, und um Beachtung der korrekten Angabe.

Korrespondenzadresse

PD Dr. Werner Hofmann

Institut für Allgemeinmedizin, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), Campus Lübeck

Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck, Deutschland

werner.hofmann@uksh.de

Die Online-Version des Originalartikels ist unter <https://doi.org/10.1007/s00391-020-01758-7> zu finden.