

Z Rheumatol 2022 · 81:524
<https://doi.org/10.1007/s00393-022-01238-w>
Online publiziert: 23. Juni 2022
© The Author(s), under exclusive licence to
Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2022



Erratum zu: Gicht

Anne-Kathrin Tausche

Medizinische Klinik III, Rheumatologie, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Technische Universität
Dresden, Dresden, Deutschland

Erratum zu:

Z Rheumatol 2022

<https://doi.org/10.1007/s00393-022-01218-0>

In dem ursprünglichen Beitrag finden sich leider Fehler im Fragebogen.

Bitte beachten Sie den korrigierten Fragentext:

Ein 57-jähriger Patient hat einen akuten Gichtanfall. Er hat keine Vorerkrankungen und eine normale Nierenfunktion. Welche Therapie sollte am ehesten eingeleitet werden?

- Colchicin 6 × 0,5 mg täglich
- Metamizol 3 × 500 mg täglich
- Etoricoxib 120 mg täglich
- Prednisolon 100 mg einmalig i.v.
- Canakinumab 150 mg s.c. einmalig

Wir entschuldigen uns für unser Versehen.

Die Redaktion

Korrespondenzadresse

PD Dr. Anne-Kathrin Tausche

Medizinische Klinik III, Rheumatologie,
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus,
Technische Universität Dresden
Fetscherstr. 74, 01309 Dresden, Deutschland
anne-kathrin.tausche@uniklinikum-dresden.de

Die Online-Version des Originalartikels ist unter
<https://doi.org/10.1007/s00393-022-01218-0>
zu finden.