

psychopraxis.neuropraxis 2015 · 18:28
DOI 10.1007/s00739-015-0228-3
Online publiziert: 3. Februar 2015
© Springer-Verlag Wien 2015

Nora Hergovich · Elisabeth Fertl
Neurologische Abteilung, KA Rudolfstiftung, Wien, Österreich

Erratum zu: Psychose bei hochaktivem MS-Verlauf

Eine komplexe neuropsychiatrische Patientin mit großer Lebenslust und wechselhafter Compliance

Erratum zu:
psychopraxis.neuropraxis 2014 17:21–23
DOI 10.1007/s00739-014-0215-0

Im Original-Beitrag ist **Tab. 2** leider fehlerhaft. Nachfolgend die Tabelle mit den korrekten Zahlen.

Mit-Autorin Prim. Univ. Doz. Dr. Elisabeth Fertl wurde in der Korrespondenz-Adresse leider ohne akademische Titel aufgeführt.

Korrespondenzadressen



Dr. N. Hergovich
Neurologische Abteilung
KA Rudolfstiftung, Wien
nora.hergovich@wienkav.at



Prim. Univ. Doz. Dr. E. Fertl
Neurologische Abteilung
KA Rudolfstiftung, Wien

Tab. 2 Prävalenz psychiatrischer Erkrankungen bei MS-Patienten im Vergleich zur gesunden Bevölkerung

| Psychiatrische Erkrankung | Gesunde Bevölkerung | MS-Patienten |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| Major Depression | 16,2% | 36–54% |
| Bipolare Störungen | 1–4,5% | 13% |
| Angststörungen | 28,8% | 35,7% |
| Anpassungsstörungen | 0,2–2,3% | 22% |
| Psychotische Störungen | 1,8% | 2–3% |

Die Online-Version des Originalartikels ist unter doi:10.1007/s00739-014-0215-0 zu finden.