


# Therapiealgorithmus für Patienten mit Hodgkin-Lymphom



**Abb. 1** ▲ Therapiealgorithmus für Patienten mit Hodgkin-Lymphom. Gilt nicht für NLPHL im Stadium IA, die ausschließlich bestrahlt werden (30 Gy in IFRT). Risikofaktoren sind *a* großer Mediastinaltumor, *b* Extranodalbefall, *c* erhöhte BSG, *d*  $\geq 3$  befallene Areale. ABVD Adriamycin, Bleomycin, Vinblastin, Dacarbazin; BEACOPP Bleomycin, Etoposid, Adriamycin, Cyclophosphamid, Vincristin, Procarbazin, Prednison; IFRT Involved-field-Radiotherapie; PET Positronenemissionstomographie; RF Risikofaktor; RT Radiotherapie

## Korrespondenzadresse



**Prof. Dr. Dr. h.c. A. Engert**  
 Klinik I für Innere Medizin,  
 German Hodgkin Study Group,  
 Universitätsklinik Köln  
 Kerpener Str. 62, 50937 Köln  
 a.engert@uni-koeln.de

## Einhaltung der ethischen Richtlinien

**Interessenkonflikt.** A. Engert gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.