Notfall Rettungsmed 2017 · 20:691–692
<https://doi.org/10.1007/s10049-017-0393-4>
 Online publiziert: 16. November 2017
 © Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
 Springer Nature 2017

M. Kueckelhaus¹ · T. Hirsch¹ · M. Lehnhardt¹ · A. Daigeler^{1,2}

¹ Klinik für Plastische Chirurgie und Schwerbrandverletzte, Handchirurgie-Zentrum, operatives Referenzzentrum für Gliedmaßen-tumoren, Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil, Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Deutschland

² Klinik für Hand-, Plastische, Rekonstruktive und Verbrennungschirurgie, BG Klinik Tübingen, Tübingen, Deutschland

Correction: Nekrotisierende Fasziitis der oberen und unteren Extremität

Correction:

Notfall + Rettungsmedizin 2017

<https://doi.org/10.1007/s10049-017-0319-1>

Die erste Empfehlung im Abschnitt „Therapie – Antibiotische Behandlung“ ist missverständlich ausgedrückt. Es handelt sich bei der Breitspektrumantibiose um eine Kombination der genannten Antibiotika. Es sollte daher besser heißen:

Bei Verdacht auf eine NF sollte neben der chirurgischen Therapie unverzüglich eine kalkulierte i. v. antibiotische Behandlung zur Abdeckung eines breiten Spektrums gestartet werden.

In **Tab. 3** dieses Beitrags wurden einige Einheiten nicht korrekt angegeben. Die korrigierte Tabelle können Sie anbei entnehmen.

Bitte beachten Sie zudem die korrekte Nennung der Autorenschaft: M. Kueckelhaus, T. Hirsch, M. Lehnhardt und A. Daigeler.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. A. Daigeler

Klinik für Hand-, Plastische, Rekonstruktive und Verbrennungschirurgie, BG Klinik Tübingen Schnarrenbergstr. 95, 72076 Tübingen, Deutschland
 adaigeler@bgu-tuebingen.de

Tab. 3 LRINEC-Score zur Frühdagnostik der nekrotisierenden Fasziitis

Laborwert	Punktzahl
C-reaktives Protein (mg/l)	
≤150	0
>150	4
Leukozyten (/nl)	
<15	0
15–25	1
>25	2
Hämoglobin (g/dl)	
>13,5	0
11–13,5	1
<11	2
Natrium (mmol/l)	
≥135	0
<135	2
Kreatinin (mg/dl)	
≤1,6	0
>1,6	2
Glukose (mg/dl)	
≤180	0
>180	1
Risikokategorien ^a	
Niedrig (<50 %)	LINREC ≤ 5 Punkte
Mittel (50–75 %)	LINREC 6–7 Punkte
Hoch (>75 %)	LINREC ≥ 8 Punkte

^a% = Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer Nekrotisierenden Fasziitis
 LRINEC Laboratory Risk Indicator for Necrotizing

Die Online-Version des Originalartikels ist unter <https://doi.org/10.1007/s10049-017-0319-1> zu finden.

Hier steht eine Anzeige.