Tuberkulose

Die Tuberkulose (TB) ist weltweit eine der häufigsten Infektionskrankheiten und zählt als „world's top infectious killer“ zu den zehn häufigsten Haupttodesursachen. Anlässlich der Eröffnung der „2017 World Health Organization's Global Ministerial Conference“ am 16. November 2017 in Moskau hat selbst Russlands Präsident Wladimir Putin daher die Notwendigkeit eines gemeinsamen weltweiten Kampfs gegen die TB ausdrücklich hervorgehoben [1]. In Deutschland ist vor allem migrationsbedingt ein Anstieg der Fallzahlen seit 2015 zu beobachten. Den hieraus resultierenden Informationsbedarf über die aktuellen Herausforderungen bei der Bekämpfung der TB zu beschreiben, ist das Ziel dieses Schwerpunktthefts.

Im ersten Beitrag zur Epidemiologie der TB geben *Tanja Charles* und Koautoren vom Robert Koch-Institut (RKI) einen umfassenden Überblick über die Situation in der Welt und in Deutschland. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkrankten im Jahr 2015 10,4 Mio. Menschen neu an TB, darunter 1,2 Mio. Patienten mit einer HIV-Koinfektion [2]. Während sich die Zahl der Neuerkrankungen mit einem durchschnittlichen Rückgang von ca. 1,5 % pro Jahr leicht abgeschwächt hat, ist die Zahl der geschätzten Fälle mit einer multiresistenten TB (MDR-TB) leicht angestiegen: von über 450.000 Fälle im Jahr 2012 auf 480.000 Fälle im Jahr 2015, davon 9,5 % mit einer extensiv resistenten TB (XDR-TB). Im neuesten „Global TB Report“ von 2017 [3] wird die Zahl der Neuerkrankungen im Jahre 2016 ebenfalls auf 10,4 Mio. geschätzt (darunter 10 % mit HIV); 1,7 Mio. starben an TB, davon 400.000 mit HIV.

Nachdem die TB in Deutschland über viele Jahre rückläufig war, wer-

den in jüngster Zeit wieder steigende Fallzahlen beobachtet [4]. Im Jahr 2015 wurden insgesamt 5865 Neuerkrankungen (entsprechend einer Inzidenz von 7,3/100.000 der Wohnbevölkerung) registriert, was gegenüber dem Vorjahr (4533 Fälle, Inzidenz 5,6) einem Anstieg von 29,4 % entspricht. Die Zahl der Neuerkrankungen im Jahre 2016 ist mit 5915 allerdings nahezu unverändert [5].

» Medizinisches Personal sollte TB-typische Symptome erkennen und resistente Erreger bedenken

Die Inzidenz der ausländischen Staatsbürger beträgt 50,3/100.000 Einwohner und ist damit 20-mal so hoch wie diejenige in der deutschen Bevölkerung (2,5/100.000 Einwohner). Die Prävalenz der TB/HIV-Koinfektion wird auf 4,0 % geschätzt; der Anteil an MDR-TB im Jahr 2015 beträgt 3,3 % (125 Fälle) und ist damit wenig höher als im Vorjahr (3,0 %; 94 Fälle). Als besondere Herausforderungen machen die Autoren auf die abnehmende Erfahrung des medizinischen Personals bei mit TB zu vereinbarenden Symptomen aufmerksam. Sie fordern zudem, immer an das eventuelle Vorliegen resistenter Erreger zu denken und vermehrt eine Schnellresistenztestung einzusetzen.

Passend hierzu stellt im Anschluss *Roland Diel* von der Universität Kiel die wachsende Bedeutung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes beim Screening, der Diagnostik und der Therapie der latenten (LTBI) wie der aktiven TB bei Migranten heraus. Da im Jahre 2016 durch das Röntgenscreening von Migranten im Rahmen der Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft nach § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 1262 Fälle und damit etwa ein

Viertel (24,5 %) aller in Deutschland gemeldeten TB-Fälle erfasst wurden, hält er dieses Screening trotz der geringen TB-Prävalenz von nur 0,1 % bei Flüchtlingen und einer mit etwa 56 % deutlich eingeschränkten Sensitivität der Röntgentechnik für unverzichtbar. Der zusätzliche Einsatz von Real-Time-PCR-Verfahren bei klinischem Verdacht könnte zur Detektion einer infektiösen TB bereits schon im Gesundheitsamt hilfreich sein. Angesichts von Sprach- und Kommunikationsproblemen, die durch die Vielzahl unterschiedlicher Herkunftsländer entstehen, weist er auf den bisher unzulänglichen Zugang zu geeigneten Dolmetschern in der Klinik wie in der ambulanten Praxis hin. Nur wenn dieser erheblich erleichtert würde, könnte letztlich die Therapie der aktiven TB und die Adhärenz zur präventiven Chemotherapie von Migranten bei LTBI verbessert werden.

» Für eine erfolgreiche ambulante Therapie müssen Patient, Arzt und Gesundheitsamt eng zusammenarbeiten

Im nächsten Beitrag schildert *Martin Priwitzer* vom Gesundheitsamt Stuttgart die Möglichkeiten und Defizite einer ambulanten Anschlussbehandlung der TB, die angesichts der in den letzten Jahrzehnten deutlich rückläufigen Dauer einer stationären Behandlung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Sie kann nur erfolgreich verlaufen, wenn über die formalen Vorgaben des IfSG hinaus ein Zusammenspiel zwischen Patient, Ärztinnen und Ärzten in Klinik und Praxis sowie dem Gesundheitsamt gelingt. Priwitzer betont dabei insbesondere die mög-

lichen psychosozialen Angebote des Gesundheitsamtes als wichtigem Kooperationspartner.

Vor dem Hintergrund der steigenden Fallzahlen in Deutschland fassen *Ralf Otto-Knapp*, *Britt Häcker* und *Torsten Bauer* vom Deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose (DZK) sowie *Tom Schaberg* vom Zentrum für Pneumologie in Rotenburg übersichtlich die therapeutischen Aspekte der im Juni 2017 von der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften e.V.) veröffentlichten neuen S2k-Leitlinie des DZK zur TB im Erwachsenenalter zusammen. Die Leitlinie, die vom DZK im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie (DGP) und in Zusammenarbeit mit den hierfür relevanten Fachgesellschaften erstellt wurde, löst die Empfehlungen zur Tuberkulostherapie von 2012 ab. Sie berücksichtigt nicht nur die Standardtherapie bei suszeptibler TB, sondern auch sämtliche medikamentösen Neuentwicklungen, wie die von Bedaquilin, Delamanid bzw. den Einsatz altbekannter Medikamente wie Linezolid, Isoniazid und Clofazimin, die bei komplex resistenten Tuberkulosen eingesetzt werden können. Besondere Berücksichtigung erfahren dabei Pharmakodynamik und Therapiemanagement.

Im letzten Beitrag stellen *Viola Schleusner* und Mitarbeiter der Arbeitsgruppe von *Stefan Niemann* im Forschungszentrum Borstel die zunehmende Bedeutung des „Next Generation Sequencing“ (NGS) bei der Analyse klinischer Isolate von *Mycobacterium tuberculosis* dar. Über die bereits seit längerem etablierten genombasierten Verfahren des „Fingerprintings“ mittels RFLP („Restriction Fragment Length Polymorphism“) oder MIRU-VTNR („Mycobacterial Interspersed Repetitive Units – Variable Number of Tandem Repeats“) hinaus offeriert das NGS die Möglichkeit, neben der Ermittlung von frischen Übertragungen in Infektionsketten zugleich auch resistenzinduzierende Mutationen zuverlässig zu detektieren. Für TB-Patienten kann somit ein individualisiertes molekularbiologisches Resistenzprofil erstellt werden. Aufgrund der hierbei erforderlichen aufwendigen

Infrastruktur und Komplexität der bioinformatischen Dateninterpretation eignet sich das Verfahren außerhalb spezialisierter Zentren gegenwärtig allerdings noch nicht für eine Implementierung als Routineverfahren.

Wir bedanken uns bei allen Autoren für Ihre wertvollen Beiträge.

Prof. Dr. Roland Diel

Prof. Dr. Robert Loddenkemper

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. R. Diel

Institut für Epidemiologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel
Kiel, Deutschland
roland.diel@epi.uni-kiel.de

Interessenkonflikt. R. Diel hat Honorare für Vorträge auf Symposien erhalten, die von Cepheid gesponsert wurden. R. Loddenkemper gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

1. Putin V (2017) An Unlikely Ally, Supports The Global Effort To Fight Tuberculosis. https://www.huffingtonpost.com/entry/vladimir-putin-tuberculosis-global-fight_us_5a0f318ae4b0dd63b1aa267f. Zugriffen: 27. Dez. 2017
2. World Health Organization (2016) Global tuberculosis report 2016. WHO, Genf
3. World Health Organization (2017) Global tuberculosis report 2017. WHO, Geneva. http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/. Zugriffen: 5. Dez. 2017
4. Robert Koch-Institut (2015) Tuberkulose in Deutschland: Ende des rückläufigen Trends? Epidemiol Bull 43:461–463 (https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2015/43/Art_02.html). Letzter Zugriff am 15. Juni 2017
5. Robert Koch-Institut (2017) Infektionsepidemiologisches Jahrbuch meldepflichtiger Krankheiten für 2016. Robert Koch-Institut, Berlin. http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Jahrbuch/Jahrbuch_2016.pdf?__blob=publicationFile. Zugriffen: 19. Juli 2017

In eigener Sache

Autoren WERKSTATT

GRATIS

Ein Service für Autoren von Springer Medizin

Fortbildungen für Autoren und Gutachter

Die ersten Veröffentlichungen sind für jeden Mediziner ein wichtiger Schritt in seiner Karriere als Wissenschaftler. Wissenschaftliche Artikel sind entscheidend dafür, dass die eigene Arbeit in der Community wahrgenommen wird. Es geht darum, die eigenen Ideen national und international auszutauschen und sicherzustellen, dass die Ergebnisse Wirkung erzielen. Die Online-Kurse der Autorenwerkstatt helfen, sich leicht einen Überblick über das Schreiben, Einreichen, Begutachten und Veröffentlichen eines Manuskripts zu verschaffen.

5 Online-Kurse zu den wichtigsten Standards des wissenschaftlichen Publizierens:

- Wie verfasse ich ein Manuskript?
- Writing in English für deutschsprachige Autoren
- Wie funktionieren Publikation und Begutachtung?
- Anleitung zur Open-Access-Veröffentlichung
- Leitfaden zur Peer-Review-Begutachtung

Für alle, die auf SpringerMedizin.de registriert sind!

Jetzt gratis fortbilden unter
www.springermedizin.de/autorenwerkstatt/