

Erratum to: Analysis of umbu (*Spondias tuberosa* Arruda (Anacardiaceae)) in different landscape management regimes

A process of incipient domestication?

Ernani Machado de Freitas Lins Neto · Nivaldo Peroni ·
Christine Maria Carneiro Maranhão · Maria Inês Sucupira Maciel ·
Ulysses Paulino de Albuquerque

Published online: 20 September 2011
© Springer Science+Business Media B.V. 2011

Erratum to: Environ Monit Assess
DOI 10.1007/s10661-011-2280-7

The original version of this article unfortunately contained a mistake in Table 2.

The corrected Table 2 is given below:

The online version of the original article can be found at
<http://dx.doi.org/10.1007/s10661-011-2280-7>.

E. M. de Freitas Lins Neto (✉)
Departamento de Biologia,
Universidade Federal do Piauí (UFPI),
Campus Professora Cinobelina Elvas, BR 135,
CEP 64900-000 Bom Jesus, Piauí, Brazil
e-mail: ernanilinsneto@ufpi.edu.br

N. Peroni
Departamento de Ecologia e Zoologia,
Universidade Federal de Santa Catarina,
Edifício Fritz Muller,
Florianópolis, Santa Catarina CEP 88040-970, Brazil

C. M. C. Maranhão
Departamento de Nutrição,
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),
Av. Prof. Nelson Chaves s/n, Cidade Universitária,
CEP 50670-901 Recife, Pernambuco, Brazil

M. I. S. Maciel
Departamento de Ciências Domésticas,
Universidade Federal Rural de Pernambuco,
Av. Dom Manoel de Medeiros s/n, Dois Irmãos,
CEP 52171-900 Recife, Pernambuco, Brazil

U. P. de Albuquerque
Departamento de Biologia, Área de Botânica,
Universidade Federal Rural de Pernambuco,
Av. Dom Manoel de Medeiros s/n, Dois Irmãos,
CEP 52171-900 Recife, Pernambuco, Brazil

	Fruit weight (g)		Fruit volume (cm ³)		Pulp weight (g)		Pulp content (%)		Rind thickness (mm)		Rind content (%)		Pit fresh weight (m)		Pit fresh percentage (%)		Pit fresh volume (cm ³)		Total soluble solids (°Brix)	
	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$	$\bar{x} \pm \text{s.e.}$
Pasture	27.16±1.40a	3.37±0.07a	19.35±1.11a	70.89±0.91a	1.24±0.10a	17.19±0.76a	3.21±0.21a	11.93±0.49bd	0.86±0.12a	10.13±0.25c										
C.V.*	16.29%	6.81%	18.08%	4.03%	24.75%	13.92%	20.30%	13.11%	43.62%	7.95%										
Mountain	26.86±2.49ac	3.37±0.11ac	19.71±2.07ac	72.67±0.98a	1.30±0.04a	15.29±0.41bc	3.13±0.21ac	12.04±0.73acd	0.70±0.04a	9.61±0.26b										
C.V.*	29.27%	9.91%	33.14%	4.25%	10.00%	8.39%	21.46%	19.12%	17.93%	8.71%										
Home garden	24.42±1.74ac	3.02±0.17acd	17.27±1.26ac	70.58±0.87a	1.18±0.08a	17.73±0.75a	2.85±0.26ac	11.69±0.43bd	0.70±0.02a	10.95±0.20a										
C.V.*	22.54%	17.75%	23.13%	3.88%	22.62%	13.31%	28.50%	11.69%	10.56%	5.86%										
Base of mountain	21.94±2.50bc	2.99±0.15bd	15.48±1.84bc	70.05±0.70a	1.38±0.07a	15.74±0.42ac	3.01±0.27ac	14.27±0.75a	0.66±0.04ac	9.67±0.25bc										
C.V.*	35.96%	16.15%	37.55%	3.16%	15.71%	8.47%	28.13%	16.54%	18.38%	8.24%										
Cultivated areas	22.02±1.35bc	3.04±0.11bc	15.61±1.03bc	70.65±0.98a	1.42±0.10a	17.20±0.67a	2.63±0.15bc	12.15±0.52bc	0.59±0.03bc	10.49±0.21ac										
C.V.*	19.38%	11.33%	20.78%	4.39%	21.28%	12.38%	18.57%	13.45%	13.91%	6.41%										