EULAR 2018

Verständnis der Pathophysiologie hilft bei der individuellen Therapie der PsA

Das klinische Erscheinungsbild der Psoriasis Arthritis ist komplex. Daher kann ein umfassenderes Wissen um die pathophysiologischen Zusammenhänge nützlich sein, um die Frühzeichen zu lesen, Risikofaktoren für den Übergang zur systemischen Erkrankung beziehungsweise für eine Chronifizierung zu erkennen und letztlich eine individuell maßgeschneiderte Therapie initiieren zu können.

Ein Verständnis der Pathophysiologie kann zu einer besseren Patientenversorgung führen, wie dem Vortrag von Prof. Dr. Georg Schett, Innere Medizin 3 (Rheumatologie und Immunologie), Universitätsklinikum Erlangen der Friedrich Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, im Rahmen einer „From bench to bedside“-Sitzung der EULAR (European League Against Rheumatism) zu entnehmen war. Relativ bekannt ist, dass die Interleukin(IL)-23/IL-17-Achse maßgeblich am pathophysiologischen Geschehen bei einer Plaque-Psoriasis (PsO) und Psoriasis-Arthritis (PsA) beteiligt ist und sowohl über das adaptive, als auch das angeborene Immunsystem aktiviert wird.

Der Übergang von der Plaque-Psoriasis zur Psoriasis-Arthritis

Bekannt ist auch, dass etwa 30–40 % der PsO-Patienten im Verlauf eine Gelenkbeteiligung entwickeln. Was genau in dieser Übergangsphase geschieht, war Thema von Schetts Vortrag. Die psoriatische Erkrankung wird demnach durch ein mechanisches Trauma angestoßen, beispielsweise durch schwere manuelle Arbeit oder eine Gelenkverletzung. Voraussetzung dafür, dass der pathologische Prozess in Gang kommt, ist eine genetische Disposition des Psoriasis-Patienten.

» Die Psoriasis wird durch ein mechanisches Trauma wie eine Gelenkverletzung angestoßen

In Analogie zum Köbner-Phänomen der Haut kommt es zum so genann-

ten tiefen Köbner-Phänomen an den Entesen. Das enthesiale Stadium mit Entzündung der Entesen gilt heute als Übergangsstadium von der Haut zur Gelenkerkrankung, also der PsO zur PsA.

» Voraussetzung dafür, dass der pathologische Prozess in Gang kommt, ist eine genetische Disposition

Entscheidend für den Übergang ins chronische Stadium sind Autoimmunvorgänge. Klinisch lässt sich die Gelenkbeteiligung im Sinne einer subklinischen Synovitis beziehungsweise einer subklinischen Enthesiopathie laut Schett schon früh nachweisen. Sie führt zum „Homing“ der Entzündung in muskuloskeletalen Strukturen.

Konsequenzen für die Therapie?

Ob es sinnvoll ist, PsO-Patienten daher bereits im Stadium der subklinischen Synovitis mit einem IL-17 A-Inhibitor zu behandeln, zumal wenn sie unspezifische Gelenkschmerzen aufweisen, hat die Arbeitsgruppe von Schett in einer kleinen Studie untersucht. Wie Dr. Eleni Kampylafka beim EULAR berichtete, wurden 20 Patienten mit PsO-Diagnose und Bedarf für eine systemische Therapie in die prospektive, offene „proof of concept“-Studie IVEPSA (Interception in Very Early PsA) eingeschlossen.

70 % von ihnen waren Männer, im Median 49,5 Jahre alt und seit 14 Jahren erkrankt. Ihr medianer PASI (Psoriasis Area Severity Index) betrug 6,8. Im

Median waren 10,9 % der Körperoberfläche betroffen. 55 % wiesen eine Nagel-, 75 % eine Kopfhautbeteiligung und 85 % Arthralgien auf (VAS-Pain-Score 18,5). In der körperlichen Untersuchung gaben 40 % schmerzhaft Gelenke an (10 TJC – Tender Joint Count, 0 SJC – Swollen Joint Count).

In der Bildgebung der dominanten Hand fand sich bei 83,3 % im MRT ≥ 1 entzündliche Läsion (66,7 % Synovitis, 55,6 % Tendinitis/Enthesitis). In der hochauflösenden peripheren quantitativen Computer-Tomographie (HRpQCT) konnten bei 58,8 % Erosionen und bei 41,2 % Enthesiophyten nachgewiesen werden.

» Das enthesiale Stadium gilt heute als Übergangsstadium von der Haut zur Gelenkerkrankung

Nach sechs subkutane Gaben von je 300 mg Secukinumab (Woche 0, 4, 8, 12, 16, 20) hatten sich Gelenkschmerzen und Hautsymptome am Studienende nach 24 Wochen signifikant gebessert. Zudem waren in MRT und HRpQCT keine neuen Erosionen und Proliferationen nachweisbar. Laut Kampylafka legen die Daten nahe, dass das Unterbrechen des Krankheitsprozesses im Stadium der prä-PsA möglich ist und sinnvoll sein kann.

hautnah 2018 · 17:86
<https://doi.org/10.1007/s12326-018-0293-5>

© Springer-Verlag GmbH Austria, ein Teil von Springer Nature 2018

Quelle: Dr. Wiebke Kathmann, Springer-Medizin.de