Un train peut en cacher un autre

Sometimes, a train comes by two

F. Djamouri · N. Baarir · P. Ray

Reçu le 18 juin 2012 ; accepté le 29 août 2012
© SFMU et Springer-Verlag France 2012

Un patient de 26 ans, droitier, consulte pour un œdème de la face dorsale de la main droite et des douleurs, apparues à la suite d'une rixe, au niveau de la tête des métacarpophalangiens 3, 4 et 5, douleur majorée à la palpation. Lors de la lecture de la radiographie, l'œil est immédiatement attiré vers la fracture déplacée (flèche) de la tête du 4^e métacarpien droit (Fig. 1 A). En revanche, la fracture (flèche) à la base du

cinquième métacarpien droit (Fig. 1 A et B) est plus difficilement mise en évidence. Ce cas clinique permet de rappeler que les poings des pugilistes frappent toujours de dehors en dedans expliquant l'exposition première du 5^e métacarpien d'où une recherche systématique d'une lésion de cet os, avec une radiographie comportant deux incidences complémentaires (face + profil ou face + 3/4).

Fig. 1 Radiographie de face montrant les fractures des 4^e et 5^e MTC

F. Djamouri · N. Baarir · P. Ray (✉)
Service d'accueil des urgences, hôpital Tenon, 4, rue de la Chine,
F-75020 Paris, France
e-mail : patrick.ray@tnn.aphp.fr

Université Pierre-et-Marie-Curie Paris 6, 4, place Jussieu, F-
75005 Paris, France