

editorial \_\_\_\_\_

**3 Kostenentwicklung in der onkologischen Behandlung**

Veränderung der Versorgungsabläufe ist nicht qualitätsgetrieben  
*Gunter Schuch*

journal club \_\_\_\_\_



**10 Multimodale Therapie beim Lungenkarzinom**

Rolle der Resektion in Kombination mit Bestrahlung und Chemotherapie  
*Lars Arne Berger*

**14 Weichteilsarkome**

Eribulin effektiv bei fortgeschrittenen Lipo- oder Leiomyosarkomen  
*Andreas Schalhorn*

**18 Von Vorteil für das Überleben von Patientinnen mit frühem nodalpositivem Mammakarzinom**

Radiatio der Mammaria-interna-Lymphknoten  
*Marie-Luise Sautter-Bihl und Felix Sedlmayer*

**22 Brustkrebs**

Kardiale Toxizität von Trastuzumab in der adjuvanten Therapie  
*David Krug*

**24 PET-Scan-Kontrollen beim fortgeschrittenen M. Hodgkin**

Eine Möglichkeit zur Modifikation der Behandlungsstrategie  
*Erhard Hiller*

**28 ASCO-Praxisleitlinien**

Aktive Überwachung beim lokalisierten Prostatakarzinom bestätigt  
*Ulrich R. Kleeberg*

**30 Fortgeschrittenes Rektumkarzinom**

Lokale oder totale mesorektale Exzision?  
*Gunther Klautke*

**32 Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom im Frühstadium**

Überlebensvorteil durch konsolidierende Strahlentherapie?  
*Khaled Elsayad und Hans Theodor Eich*

neues aus der forschung \_\_\_\_\_



**35 Trends und Daten aus der Onkologie**

Metastasierendes Mammakarzinom: Mit CDK4-/CDK6-Inhibitor länger progressionsfrei

Multikinaseinhibitor bei myelodysplastischem Syndrom: Vorteil nur für bestimmte Subgruppen?

Prostatakarzinom: Androgensuppression lohnt sich auch bei lokal begrenztem Tumor

Peptidrezeptor-Radionuklid-Therapie: Effektiver Ansatz bei NET

Lokal fortgeschrittenes Pankreaskarzinom: Chemo mit oder ohne Bestrahlung?

Tumorschmerzen: Sind alle Opiode gleich?

Hodgkin-Lymphom: Chemotherapien im Vergleich

Chemotherapie bei Darmkrebs: Muskelschwund verkürzt das Leben

Kooperationspartner



**Die KrebsSpezialisten.**  
Weil Kompetenz und Engagement zählen.

**BNHO**  
Berufsverband der Niedergelassenen  
Hämatologen und Onkologen in Deutschland e.V.

Kontakt:  
Sachsenring 57  
50677 Köln  
Tel.: 0221 9987980  
Fax: 0221 99879822  
Geschäftsführung:  
Armin Goetzenich

zertifizierte fortbildung



- 40 **Diagnostik und Therapie bei CLL**  
Individualisiertes Vorgehen zur Optimierung des Behandlungserfolges  
*Manuela Bergmann, Clemens-Martin Wendtner*
- 47 **CME Fragen**

onkologie aktuell



- 50 **ASCO-Jahrestagung 2016**  
Kollektives Wissen zum Wohle der Patienten
- 55 **Jahrestagung der Association for Cancer Immunotherapy**  
„Impfstrategien werden eine Renaissance erleben“  
*Im Gespräch mit Dr. Sebastian Kreiter und Christine Castle*
- 58 **Immunotherapy of Cancer Conference 2016**  
Gezielt Kombinationen entwickeln

rubriken

- 62 infopharm
- 71 Editorial Board | Impressum | Kontakt

Beihefter/Beilagen

- Medizin Report aktuell:** Chronische lymphatische Leukämie (CLL): Therapie bei Hochrisikopatienten: MRD-Negativität als Behandlungsziel (nach S. 59)
- Pharmawissen aktuell:** Metastasiertes HR-positives/HER2-negatives Mammakarzinom: Nab-Paclitaxel in frühen Therapielinien effektiv und verträglich (nach S. 65)
- Pharmawissen aktuell:** Chronische myeloische Leukämie: Erstlinientherapie mit Dasatinib: Schnelle und tiefe Remission erreichbar (nach S. 67)

Hier steht eine Anzeige.



## übersicht der referierten studien

titel	zeitschrift	autor	referat & kommentar	seite
<b>Tumoren des Gastrointestinaltrakts [C15–C26]</b>				
Fortgeschrittenes Rektumkarzinom: Lokale oder totale mesorektale Exzision?	Medicine (Baltimore). 2016;95(20):e3718.	Jung SM et al.	Gunther Klautke, Chemnitz	30
<b>Tumoren der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe [C30–C39]</b>				
Multimodale Therapie beim Lungenkarzinom: Rolle der Resektion in Kombination mit Bestrahlung und Chemotherapie	J Clin Oncol. 2015;33(35):4194-201.	Eberhardt WE et al.	Lars Arne Berger, Hamburg	10
<b>Bösartige Neubildungen des mesothelialen und des Weichteilgewebes [C45–C49]</b>				
Weichteilsarkome: Eribulin effektiv bei fortgeschrittenen Lipo- oder Leiomyosarkomen	Lancet. 2016;387(10028):1629-37.	Schöffski P et al.	Andreas Schalhorn, München	14
<b>Tumoren der Brustdrüsen [C50–C50]</b>				
Von Vorteil für das Überleben von Patientinnen mit frühem nodalpositivem Mammakarzinom: Radiatio der Mammaria-interna-Lymphknoten	J Clin Oncol. 2016;34(4):314-20.	Thorsen LB et al.	Marie-Luise Sautter-Bihl, Karlsruhe, Felix Sedlmayer, Salzburg, Österreich	18
Brustkrebs: Kardiale Toxizität von Trastuzumab in der adjuvanten Therapie	J Clin Oncol. 2016;34(6):581-7.	Advani PP et al.	David Krug, Heidelberg	22
<b>Tumoren der männlichen Geschlechtsorgane, der Nieren und der Harnwege [C60–C68]</b>				
ASCO-Praxisleitlinien: Aktive Überwachung beim lokalisierten Prostatakarzinom bestätigt	J Clin Oncol. 2016;34(18):2182-90.	Chen RC et al.	Ulrich R. Kleeberg, Hamburg	28
<b>Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes [C81–C96]</b>				
PET-Scan-Kontrollen beim fortgeschrittenen M. Hodgkin: Eine Möglichkeit zur Modifikation der Behandlungsstrategie	N Engl J Med. 2016;374(25):2419-29.	Johnson P et al.	Erhard Hiller, München	24
Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom im Frühstadium: Überlebensvorteil durch konsolidierende Strahlentherapie?	J Clin Oncol. 2015;10(33): 3710-7.	Vargo JA et al.	Khaled Elsayad, Münster Hans Theodor Eich, Münster	32