Bakterielle Arthritis

Frühe Antibiotikatherapie rettet Gelenk und Leben

An eine Infektion als Ursache von akuten Gelenkschmerzen mit Fieber muss man besonders bei bestimmten Risikopersonen denken. Hierzu zählen Patienten mit intravenösem Drogenkonsum, Immunsuppression, lang dauernder Steroidtherapie, schlecht eingestelltem Diabetes, chronischen Hautläsionen, niedrigem sozioökonomischem Status oder Malnutrition.

Septische Arthritis am Knie einer 80-jährigen Patientin.

— Anfällig für infektiöse Komplikationen sind auch Gelenke, die bereits durch ein Trauma oder durch Rheuma bzw. Arthrose vorgeschädigt sind. Besonders beachtet werden müssen als Risikofaktoren für eine bakterielle Gelenkinfektion zurückliegende Steroidinjektionen in die Gelenke, endoprothetische Operationen oder eine Sepsis. Als besonderes Alarmsignal nannte Dr. med. Wolfgang Heinz, Karl-Olga-Krankenhaus Stuttgart, die Kombination von Gelenkprothese und Hautinfektion.

Anhand von klinischen Kriterien lässt sich bereits zuordnen, ob ein Gelenkschmerz eher entzündlich oder eher mechanisch bedingt ist. Ruhe- und Morgenschmerz, fehlende Besserung bei Lagewechsel, dumpfer, bohrender oder pulsierender, oft diffuser oder lokoregionärer Schmerz und begleitende Allgemeinsymptome sprechen für Entzündung. Liegt ein mechanisches Problem vor, klagen die Patienten eher über Belastungs- oder Anlaufschmerz, und die

Beschwerden bessern sich bei Positionswechsel. Sie werden als stechend, drückend oder schneidend empfunden und sind meist gut lokalisierbar.

Prädilektionsstelle am Knie

Die meisten Patienten mit bakterieller Arthritis kommen mit ihren Gelenksbeschwerden erst nach 1–2 Wochen zum Arzt. Das betroffene Gelenk ist überwärmt, geschwollen und schmerzhaft. Rund 60% der Patienten haben Fieber. Typischerweise sind es die großen Gelenke am Bein, die von einer bakteriellen Arthritis betroffen sind. Etwa ein Fünftel der Patienten weist einen Befall von mehr als einem Gelenk auf. Die Mortalität liegt bei gut 10%, wenn nur ein Gelenk infiziert ist. Sind mehrere Gelenke infiziert, versterben bis zu 50% der Patienten. Als mit Abstand häufigster Erreger wird *Staphylococcus aureus* gefunden.

Leukozytose, CRP-Erhöhung und beschleunigte BSG ermöglichen nicht, differenzialdiagnostisch abzugrenzen zwischen einer infektiösen und einer nicht infektiösen Ursache einer Arthritis. Besser geeignet als Marker einer bakteriellen Infektion ist Procalcitonin. Auch eine Blutkultur gehört immer zur Diagnostik. Um die Auswahl des Antibiotikums zu unterstützen, sollten auch Leber- und Nierenfunktionsparameter erhoben werden.

Auch bildgebende Befunde erlauben keine zuverlässige Beurteilung der infektiösen Genese. Mit dem MRT lässt sich jedoch sehr gut eine eventuell bestehende Osteomyelitis erkennen. Und die Punktion, die für die Diagnose einer bakteriellen Arthritis erforderlich ist, sollte unter sonografischer Kontrolle

vorgenommen werden. Werden Gelenke mit Prothesen punktiert, sollte dies nur im OP unter streng aseptischen Bedingungen erfolgen. Sonst kann es passieren, dass der Patient vielleicht vorher gar keine Infektion im Gelenk hatte, nach der Punktion aber eine bekommt. Mehr als 50.000 / μ l Leukozyten, mehr als 100 mg/dl Laktat, > 90% Granulozyten, eine erniedrigte Glukosekonzentration oder ein LDH-Wert > 250 U/L in der entnommenen Gelenkflüssigkeit spricht für eine bakterielle Arthritis. Immer sollte mit dem Punktat auch eine Erregerkultur angelegt werden.

Antibiotika sofort nach Punktion

Ein verzögerter Therapiebeginn stellt den wichtigsten Prädiktor für ein schlechtes Outcome dar. Deshalb muss die antibiotische Therapie sofort nach der Punktion beginnen. Für Patienten ohne Risikofaktoren eignen sich Flucloxacillin plus Fusidinsäure oder Gentamicin, Clindamycin plus ein Cephalosporin der 2. oder 3. Generation oder auch Levofloxacin plus Rifampicin. Besteht aufgrund der Anamnese ein Verdacht auf gramnegative Keime, kommt ein Cephalosporin der 2. oder 3. Generation oder Levofloxacin, ggf. plus Flucloxacillin zum Einsatz. Bei einem MRSA-Risiko sollte Vancomycin plus ein Cephalosporin der 2. oder 3. Generation eingesetzt werden. Eine Gonokokken- oder Meningokokken-Arthritis sollte mit Ceftriaxon oder gezielt nach Resistenzlage behandelt werden. Zusätzlich zur Antibiotikatherapie muss bei jeder bakteriellen Arthritis das Gelenk saniert werden.

Dr. med. Angelika Bischoff

■ 51. Ärztekongress, Stuttgart, 2016